

**ANALISIS FAKTOR KARAKTERISTIK RESPONDEN YANG MEMPENGARUHI
PREVALENSI DEPRESI KEHAMILAN DI PUSKESMAS BOJONG RAWALUMBU
KOTA BEKASI**

Oleh :

Rohmawati

NIM. 201905076

ABSTRAK

Latar Belakang : Kehamilan menjadi salah satu hal yang diharapkan oleh perempuan dalam proses kehidupan. Namun banyak perempuan yang mengalami kesulitan akibat perubahan fisik, sosial maupun psikologis selama kehamilan, bahkan ada beberapa ibu yang mengalami gangguan psikologis seperti depresi.

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor karakteristik responden terhadap kejadian depresi ibu hamil.

Metode : Desain penelitian ini menggunakan desain *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 responden ibu hamil dengan menggunakan alat skrining *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS).

Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian depresi ibu hamil adalah pendidikan ($p= 0,011$), pendapatan ($p= 0,046$), riwayat kekerasan dalam rumah tangga ($p= 0,028$) dan komplikasi kehamilan ($p= 0,043$) sedangkan faktor yang tidak berhubungan antara lain usia ($p= 0,098$), pekerjaan ($p= 0,829$) dan paritas ($p= 0,139$) dengan $\alpha = 0,05$.

Kesimpulan : Faktor pendidikan, pendapatan, riwayat kekerasan dalam rumah tangga dan riwayat komplikasi kehamilan berpengaruh terhadap kejadian depresi ibu hamil. Diharapkan tim tenaga kesehatan terutama bidan dan perawat tidak hanya fokus kepada kesehatan fisik saja tetapi kesehatan mental juga perlu diperhatikan, dan di harapkan menyediakan layanan skrinning dan layanan psikologi kehamilan guna mengidentifikasi pasien berisiko mengalami depresi.

Keyword : *Depresi, Kehamilan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Prenatal.*

**ANALYSIS OF RESPONDENT CHARACTERISTICS FACTORS AFFECTING THE
PREVALENCE OF PREGNANCY DEPRESSION IN BOJONG HEALTH CENTER
RAWALUMBU BEKASI CITY**

ABSTRACT

Pregnancy becomes one of the things expected by women in the process of life. However, many women have difficulties due to physical, social and psychological changes during pregnancy, there are even some mothers who have psychological disorders such as depression. The design of this study uses design cross sectional. Samples in this study as many as 85 respondents pregnant women, using screening tool Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). The results of this study showed that the factors associated with the incidence of depression in pregnant women were education ($p = 0,011$), income ($p = 0,046$), history of domestic violence ($p = 0,028$) and pregnancy complications ($p = 0,043$) while the factors that were not related were age ($p = 0,098$), occupation ($P = 0.829$) and parity ($p = 0,139$) with $\alpha = 0,05$. Factors of education, income, history of domestic violence and history of pregnancy complications affect the incidence of depression in pregnant women. It is expected that the team of health workers, especially midwives and nurses, will not only focus on physical health but mental health also needs to be considered, and is expected to provide screening services and pregnancy psychology services to identify patients at risk of depression.

Keyword : Depression, Domestic Violence, Pregnancy, Prenatal.