Given Content

HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN TINGKAT KEPARAHAN STROKE PASIEN DEWASA DI RSUD X BEKASI

Oleh:

Aisyah Latifa Amalia

NIM. 201905008

ABSTRAK

Pendahuluan: Serangan stroke saat ini sudah bergeser dari yang menjangkit kalangan lanjut usia (lansia), kini menjadi ke kalangan usia produktif atau usia dewasa (awal dan madya) yang berdampak kecacatan hingga kematian. World iHealth iOrganization (2020), menyatakan bahwa insiden stroke usia muda telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan berdasarkan data Riskesdas (2018) menyatakan bahwa kejadian stroke pada tahun 2018 pada usia lebih dari 15 tahun sebesar 10,9% atau setara dengan 2.120.362. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor pola makan yang diketahui memiliki dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan tingkat keparahan stroke pasien dewasa di RSUD X Bekasi. Metode: Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan dengan desain penelitian cross sectional. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner Pola Makan dan lembar observasi National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) kepada 30 responden yang dirawat inap di RSUD X Bekasi. Kemudian, data dianalisis menggunakan SPSS dengan uji Chi-Square. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Pola Makan dengan Tingkat Keparahan Stroke Pasien Dewasa di RS X Bekasi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,185 ($\alpha > 0,05$) dan memiliki hubungan yang lemah ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar r 0,134. Kesimpulan: Pola Makan tidak berhubungan dengan Tingkat Keparahan Stroke Pasien Dewasa di RSUD X Bekasi.

Kata kunci: Pola Makan, Tingkat Keparahan Stroke, Pasien Dewasa

ABSTRACT

Currently, stroke attacks have shifted from infecting the elderly (elderly), to now being of productive age or adulthood (early and middle) which has an impact on disability and death. World Health Organization (2020), states that the incidence of stroke at a young age has increased in recent years. Meanwhile, based on Riskesdas data (2018) it states that the incidence of stroke in 2018 at the age of more than 15 years is 10.9% or the equivalent of 2,120,362. This can occur due to dietary factors which are known to have a negative impact on body health. This study aims to determine the relationship between diet and stroke severity in adult patients at RSUD X Bekasi. The type of research in this research is descriptive research with a quantitative approach and with a cross-sectional research design. Data collection was carried out using the Dietary Questionnaire and the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) observation sheet for 30 respondents who were hospitalized at RSUD X Bekasi. Then, the data were analyzed using SPSS with the Chi-Square test. The results of this study indicate that there is no relationship between diet and stroke severity in adult patients at X Bekasi Hospital which is indicated by a significant value (p-value) of 0,185 ($\alpha > 0.05$) and has a weak relationship indicated by a correlation coefficient value of r 0.134. Diet is not related to Stroke Severity Rate of Adult

Patients at X Bekasi Hospital.

Keywords: Diet, Stroke Severity, Adult Patients

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

A. Latar Belakang

Penyakit stroke hingga saat ini masih menjadi masalah penyakit nomor tiga di dunia, dahulu stroke dianggap sebagai penyakit yang hanya diderita oleh lanjut usia, akan tetapi saat ini terjadi pergeseran epidemiologi yang menjangkit individu usia kurang dari 70 tahun (World Health Organization, 2020). Stroke merupakan perubahan neurologis yang disebabkan karena adanya gangguan suplai darah ke otak, dapat terjadi sebab pembuluh darah pecah atau adanya sumbatan oleh gumpalan yang mana hal tersebut mampu menghambat oksigen dan nutrisi sehingga mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak (World Health Organization, 2023). Stroke iskemik terjadi karena durasi lamanya sumbatan pada pembuluh darah arteri pada area otak (Corwin, (2009) dalam Haryono & Utami, (2019). Stroke perdarahan terjadi ketika pembuluh darah yang berada di otak bocor keluar dari pembuluh darah sehingga suplai darah di daerah tersebut menjadi kurang yang mengakibatkan ikelompokan hingga kematian (Purbaningsih et al., 2021). Terdapat dua kelompok penyebab cedera pembuluh darah otak (cerebrovascular), yaitu stroke sumbatan (ischaemic) atau stroke perdarahan (haemorrhagic) (Haryono & Utami., 2019). Dengan demikian penyakit stroke merupakan penyakit pembuluh darah yang sangat berbahaya jika tidak diatasi.

World Health Organization (2020), menyatakan penderita stroke pada tahun 2030 akan mencapai angka 52 juta pengidap pertahun. Stroke biasa terjadi pada populasi lansia dan kurang dari 5% menjangkit usia muda, akan tetapi saat ini insiden stroke usia muda telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir (World Health Organization, 2020). Berdasarkan data di Amerika pada selama periode tahun 2013 sampai 2016 dilaporkan ada 7 juta penduduk yang mengidap stroke (Chamberlain, 2019). Kemudian, di negara Sub-Sahara Afrika pada tahun 2017 tercatat 316/100,000 populasi penderita stroke pertahunnya (Yuyun et al., 2020). Lebih lanjut, di negara China kejadian stroke pada tahun 2016 tercatat 240/100,000 populasi pertahun (Zhao et al., 2019). Lalu, berdasarkan data dari American Heart Association (AHA) menyatakan bahwa stroke telah menjangkit usia dewasa muda dengan catatan rentang usia 45 – 49 tahun didominasi oleh pria daripada wanita, akan tetapi antara rentang usia 15 – 30 tahun jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria yang didominasi dengan jenis stroke iskemik (sumbatan) (George, 2020). Dengan demikian, hal tersebut berisiko meningkatkan angka morbiditas hingga mortalitas dalam populasi pengidap PTM.

Angka kejadian stroke usia dewasa muda atau masa produktif (usia <45 tahun) di Brazil pada tahun 2015 tercatat ada 923 pasien (Cabral et al., 2017). Lanjut, di Korea pada tahun 2015 tercatat ada 630/100,000 orang pertahun (Kim, 2021). Lalu pada tahun 2017 di Myanmar telah melaporkan angka kejadian stroke yaitu 165/100,000 orang (Venketasubramanian et al., 2021). Lebih lanjut, berdasarkan data dari Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki,) menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penderita stroke terbanyak di Asia, dengan rerata usia >60 tahun di urutan kedua dan usia 15-59 tahun berada di urutan kelima. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Alchuriyah & Wahjuni, (2016) bahwa mayoritas pasien usia lebih dari 50 tahun mengalami obesitas (53,3%), peningkatan kadar kolesterol (58,3%) sebagai faktor risiko yang mempengaruhi kejadian stroke,ipun obesitas juga mempengaruhi kejadian stroke di usia muda.

Berdasarkan data (Riskesdas, 2018) tentang kejadian stroke di Indonesia menyatakan prevalensi PTM mengalami kenaikan dari tahun 2013 yaitu 7% menjadi 10,9% pada tahun 2018. Kemudian, kejadian stroke di Indonesia tahun 2018 terhadap penduduk usia lebih dari 15 tahun sebesar 10,9% atau setara dengan 2.120.362 orang (Aprianda, 2019). Lebih lanjut berdasarkan data dari Tim Riskesdas (2019), menunjukkan provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi stroke sebesar 11,4% atau diperkirakan ada 131.846 orang pengidap. Jumlah penderita stroke usia 15 – 64 tahun yaitu setara dengan 0,6% – 32,4% dengan pengidap terbanyak yaitu laki-laki dibandingkan perempuan sebesar 11% dan 10,9%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Martono et al (2022), stroke pada usia produktif kisaran usia 17 - 65 tahun tercatat 112 pengidap. Berdasarkan data jumlah pasien yang didapatkan peneliti dari hasil publikasi RSUD X Bekasi di website RSUD Kota Bekasi (2021), periode tahun Februari - April yaitu tercatat 380 pasien stroke rawat inap. Dengan demikian data tersebut menggambarkan bahwa PTM stroke telah menjadi masalah serius yang bergeser dari populasi lanjut usia kini menyerang usia lebih muda.

Saat ini stroke telah menjadi penyebab utama kecacatan bahkan kematian secara global (WHO, 2022). Stroke juga disebut sindrom yang terjadi karena adanya gangguan dalam peredaran darah di salah satu area otak sehingga terjadi defisit neurologis hingga ikelompokan isaraf (Saraswati 2021). Secara fisik dampak dari kejadian stroke tersebut dapat menghambat atau menjadi kendala kemampuan untuk beraktivitas akibat mengalami kecacatan fisik baik ikelompokan, ikemampuan, ikesulitan untuk berkomunikasi (Marbun et al., 2016). Selain itu stroke juga berdampak secara psikologis yaitu, pengidap akan mengalami stress karena

tidak lagi mampu beraktivitas dan butuh orang lain sebagai caregiver (seseorang yang mengurus dan merawat) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang pengidap beranggapan bahwa dirinya menyusahkan orang lain terkait kondisinya (Marbun *et al.*, 2016). Lebih lanjut, dampak secara ekonomi yaitu, pengidap tidak mampu melakukan kegiatan seperti bekerja dalam usia produktifnya dan kejadian penurunan kualitas hidup (Smajlovic, 2015). Sementara itu dampak terburuk stroke idusia dewasa muda adalah kematian, akan tetapi hal tersebut jarang terjadi karena pada usia dewasa muda sistem tubuh masih mengalami generasi yang baik dibanding dengan usia lanjut usia non produktif (>65 tahun) yang telah mengalami penurunan generasi sistem tubuh (degenerative) (Smajlovic, 2015). Kejadian stroke bisa mendadak dan berlangsung selama 24 jam atau lebih, sebab gangguan peredaran darah di otak (Saraswati 2021). Kejadian stroke pada individu menimbulkan tanda dan gejala yang sesuai dengan area fokal yang terganggu, seperti pelenyahan, kelemahan (hemiparase) dan/atau kelumpuhan/kebas (hemiplegia) separuh dan/atau keseluruhan badan, penurunan kesadaran hingga gangguan penglihatan yang terjadi mendadak (Pinzon & Asanti, 2020). Oleh karena itu, penting bagi penderita stroke untuk tetap menjaga kesehatan selama proses rehabilitasi. Faktor resiko yang mendukung kejadian stroke, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Faktor yang dapat diubah salah satunya yaitu pola makan (Haryono & Utami, 2019). Pola makan menurut Nurzakiah *et al.* (2021), dapat dikenal sebagai frekuensi, banyak, ukuran, varian pangan, hingga jarak waktu makanan dan minuman yang dikonsumsi. Adapun klasifikasi pola makan dibagi menjadi dua yaitu pola makan sehat yang merupakan usaha mengatur jenis makanan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, peningkatan status gizi dan nutrisi, juga menghindari berbagai jenis penyakit, sedangkan pola makan kurang sehat merupakan konsumsi makanan dengan gizi yang kurang seimbang, tidak menghasilkan nutrisi yang cukup guna menjaga kesehatan tubuh serta mengantisipasi penyakit, seperti konsumsi makanan instan (fast food) yang dikenal dengan istilah "Junk Food" (makanan sampah) (Pamelia, 2018). Adapun beberapa penyakit yang muncul akibat dari pola makan yang kurang sehat yaitu diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, kanker, penyakit arteri koronaria, sirosis, osteoporosis, dan berbagai penyakit kardiovaskular Mulyati *et al.*, (2022). Dengan demikian, mengatur pola makan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kejadian stroke berulang pasien dengan stroke serta komplikasi penyakit lainnya (Distapang, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Alchuriah *et al.* (2016) menyatakan bahwa riwayat pola makan yang tidak sehat mampu meningkatkan serangan stroke di usia dewasa muda, lebih lanjut menurut penelitian dari Budi & Bahar (2017), menyatakan bahwa faktor resiko kejadian stroke pada umur 31 – 35 tahun (4,2%) yaitu pola makan dengan lemak berlebihan (87,5%) (Budi & Bahar, 2017). Hasil penelitian Ramadhani & Adriani, (2014) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat makan responden yang buruk sebanyak 45 kali lebih beresiko terjadi stroke dibanding dengan responden dengan riwayat makan yang baik (Ramadhani & Adriani, 2014). Selain itu, hal ini didukung oleh penelitian Purwaningtyas *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan tinggi lemak memiliki peluang (OR) 6,7 kali terserang stroke usia dewasa muda (Purwaningtyas *et al.*, 2015). Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam (2014), menyatakan bahwa pola makan dengan tingkat keparahan stroke memiliki hubungan yang signifikan terhadap seluruh responden. Sedangkan, menurut penelitian Lavados *et al.* (2020), menyatakan tidak adanya hubungan antara pola makan dengan tingkat keparahan stroke.

Pentingnya mengontrol pola makan dengan jenis, jumlah, dan frekuensi yang sesuai dapat mempengaruhi kejadian stroke (Nurhikmah *et al.*, 2021). Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut adalah tempat dan waktu penelitian serta tingkat keparahan yang dinilai melalui kuesioner pola konsumsi makanan dan lembar observasi NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale). Namun demikian, sejauh pengetahuan peneliti, masih jarang penelitian yang dilakukan mengenai pola makan dengan tingkat keparahan stroke pada usia dewasa dengan menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari penelitian Kristiyawati (2008) dan lembar observasi NIHSS. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola makan dengan tingkat keparahan stroke pada pasien dewasa di RSUD X Bekasi.

B. Rumusan Masalah

Penyakit stroke hingga saat ini masih menjadi masalah nomor tiga di dunia yang mengalami transisi dari lansia kini menjangkit usia muda (World Health Organization, 2020). Saat ini stroke telah menjadi penyebab utama kecacatan bahkan kematian secara global (WHO, 2022). Lebih lanjut, salah satu faktor yang mempengaruhi deficit neurologis yaitu pola makan (Distapang, 2018). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam (2014), menyatakan bahwa pola makan dengan tingkat keparahan stroke memiliki hubungan yang signifikan terhadap seluruh responden. Meskipun sudah ada yang melakukan penelitian tersebut namun, masih jarang penelitian yang membahas mengenai pola makan dengan tingkat keparahan stroke usia dewasa dengan menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian Kristiyawati (2008) dan lembar observasi NIHSS. Oleh karena itu, pernyataan penelitian ini adalah "Bagaimana Hubungan Pola Makan dengan Tingkat Keparahannya Stroke Pasien Dewasa di RSUD X Bekasi?".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola makan dengan tingkat keparahan stroke pada usia dewasa di RSUD IX Bekasi.

2. Tujuan khusus penelitian

a. Untuk mengetahui karakteristik responden (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan) pasien stroke usia dewasa di RSUD IX Bekasi

b. Untuk mengetahui karakteristik pola makan (pola makan sehat dan pola makan tidak sehat) pasien stroke usia dewasa di RSUD IX Bekasi

c. Untuk mengetahui karakteristik tingkat keparahan stroke (berdasarkan lembar observasi INIHSS) usia dewasa di RSUD IX Bekasi

d. Untuk menganalisis hubungan pola makan dengan tingkat keparahan stroke pada pasien usia dewasa di RSUD IX Bekasi

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perawat

Bagi tenaga Kesehatan agar lebih waspada dan memperhatikan makanan yang diberikan oleh keluarga pasien kepada pasien

2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar kebijakan prosedur pola diet bagi pasien di rumah sakit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan (sumber referensi) penelitian untuk melanjutkan serta mengembangkan faktor risiko pola makan dengan tingkat keparahan stroke di usia dewasa.

2

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai teori-teori terkait hal yang akan diteliti. Adapun uraian tersebut terdiri dari pembahasan mengenai konsep stroke berupa definisi, etiologi dan faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, konsep pola makan, konsep tumbuh kembang.

A. Konsep Stroke

1. Definisi

Stroke merupakan perubahan neurologis yang disebabkan karena adanya gangguan suplai darah ke otak, dapat terjadi sebab pembuluh darah pecah atau adanya sumbatan oleh gumpalan yang mana hal tersebut mampu menghambat oksigen dan nutrisi sehingga mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak (World Health Organization, 2023).

Cedera serebrovaskular (stroke atau serangan otak) adalah cedera atau kematian pada bagian otak yang disebabkan karena gangguan suplai darah ke area tersebut yang menyebabkan disabilitas, seperti kelumpuhan (paralisis) atau gangguan bicara (Doenges et al., 2021).

Stroke merupakan masalah peredaran darah di otak yang menjadi sebab kematian jaringan otak dan mengakibatkan penderitanya mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian (Haryono & Utami, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa stroke merupakan penyakit tidak menular yang sangat berbahaya dan butuh penanganan segera, jika tidak maka akan menjadikan penderitanya cacat hingga meninggal.

2. Etiologi

Menurut Haryono & Utami (2019) stroke bisa terjadi akibat sumbatan arteri (iskemik) dan iruptur pembuluh darah (hemoragik). Adapun uraian penyebab stroke sebagai berikut:

a. Stroke Sumbatan (Iskemik)

Terdapat sekitar 80% kasus stroke yaitu iskemik. Stroke iskemik terjadi saat arteri di otak mengalami menyempit atau adanya hambatan yang mengakibatkan aliran darah sangat berkurang (iskemia). Stroke iskemik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Stroke Trombotik

Stroke trombotik terjadi ketika gumpalan darah (thrombus) terbentuk di bagian arteri yang memasok darah ke otak. Gumpalan tersebut terbentuk karena adanya akumulasi lemak (plak) yang menumpuk di arteri sehingga mengakibatkan aliran darah menyempit (aterosklerosis).

2) Stroke Embolik

Stroke embolik terjadi ketika thrombus atau debris (serpihan) menyebar dari otak kemudian tersapu melalui aliran darah. Jenis gumpalan darah ini disebut embolus. Stroke embolik berkembang setelah terjadinya oklusi arteri yaitu kondisi dimana arteri yang memasok darah ke otak tersumbat sehingga otak tidak memperoleh oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan (Haryono & Utami, 2019).

b. Stroke Hemoragik

Stroke hemoragik dapat terjadi saat pembuluh darah di otak mengalami kebocoran yang disebut pendarahan. Penyebab pendarahan otak dapat disebabkan oleh banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh

idarah, iantara ilain:

- a. Hipertensi iunstable
- b. Perawatan iyang ibelebihan idengan ipengencer idarah i(antikoagulan)
- c. Dinding ipembuluh idarah iyang imelemah i(aneurisma) i

Penyebab ipendarahan iyang ijarang iterjadi iyaitu ipecahnya ijalinan iabnormal ipembuluh idarah iberdinding itipis i(malaformasi iarteriovenosa). iJenis istroke ihemoragik iada idua, iyaitu:

1) Pendarahan iIntraserebral

Dalam ipendarahan iintraserebral, ipembuluh idarah idi iotak imengalami iruptur idan imeluas ike ijaringan isekitar iotak, iyang iakhirnya imerusak isel-sel iotak. iSebab isel-sel isehat iotak iyang itidak ibocor imengalami ikekurangan idarah iakibatnya isel-sel isehat itersebut imenjadi irusak. iHipertensi, itrauma, imalaformasi ivascular, ipenggunaan iobat ipengencer idarah i(Haryono i& iUtami, i2019).

2) Pendarahan iSubarakhnoid

Perdarahan iyang iterjadi idi iruang isubarachnoid iyang iberada idiantara ilapisan ipelindung iotak iatau imeningen. iPenyebab ipendarahan isubarachnoid ibiasa iterjadi ikarena ianeurisma iserebral iatau ikelainan iarteri ipada idasar iotak. iAneurisma iserebral iadalah iaera ikecil ibulat iatau itidak iteratur iyang imengalami ipembengkakan idi iarteri. iPembengkakan iyang iparah imembuat idinding ipembuluh idarah imelemah isehingga irentan ipecah i(Haryono i& iUtami, i2019).

c. Serangan iIskemik iSementara

Transient iIschaemic iAttack i(TIA) imerupakan iperiode isementara idari igejala iyang imirip idengan igejala istroke. iSebab ipenurunan isementara ipasokan idarah ike ibagian iotak imengakibatkan iTIA idan ibiasanya iberlangsung iselama ikurang ilebih ilima imenit. iKejadian iTIA isama iseperti istroke iiskemik, iyaitu iadanya ibekuan iatau idebris iyang imenghalangi ialiran idarah ike ibagian isystem isaraf idi iotak. iNamun, ipada ikasus iTIA itidak iterjadi ikerusakan ijaringan ipermanen idan itidak iada igejala imenetap ipada ipenderitanya (Haryono i& iUtami, i2019).

3. Factor Resiko

Menurut iPinzon &Asanti, i(2020), iada ibeberapa ifactor iyang idapat imeningkatkan ikejadian istroke, idiantaranya:

a. Factor iresiko iyang idapat idimodifikasi:

1) Gaya ihidup

a) Obesitas

Menurut hasil penelitian Setiawan (2018), menyatakan bahwa obesitas (overweight) mempengaruhi kejadian stroke pada dewasa muda, hal tersebut dinyatakan karena obesitas cenderung mengalami peningkatan kadar kolesterol, yang dapat mengakibatkan terjadinya pengendapan di dinding pembuluh darah sehingga terjadi penumpukan plak-plak (aterosklerosis), hal tersebut dapat menyumbat aliran pembuluh darah ke otak.

b) Sedentary

Seseorang dengan kurangnya aktivitas lebih mudah terjangkit stroke daripada yang banyai beraktivitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh fasilitas sehari-hari seperti mencuci baju dengan mesin untuk rumah tangga, kendaraan bermotor serta kemajuan teknologi membuat aktivitas seseorang semakin hari semakin ringan atau mudah, namun dampak buruk dari kemudahan tersebut yaitu seseorang menjadi pasif (sedentary) (Setiawan, 2018).

c) Alkoholisme

Menurut Gusmiati & Fernanda (2019), menyatakan bahwa minuman beralkohol dikenal dengan efeknya terhadap fungsi serta cara kerja otak akibat gangguan suplai darah. Seseorang yang rerata meminum alkohol lebih dari dua gelas sehari beresiko lebih tinggi terjangkit stroke. Namun konsumsi alkohol dala takaran wajar tidak mengganggu Kesehatan dan fungsi otak.

d) Pola imakan ikonsumsi ilemak idan ikolesterol itinggi

Menurut penelitian Setiawan (2018), menyatakan bahwa generasi muda sering menerapkan pola makan yang tidak sehat dengan seringnya mengkonsumsi makanan siap saji seperti pop mie, burger, yang sarat dengan lemak dan kolesterol namun tidak sehat.

e) Konsumsi iobat-obatan iterlarang (kokain idan imetamfetamin/ganja)

f) Pendidikan

Menurut hasil penelitian Pajri et al (2018), menyatakan bahwa seseorang yang tidak bersekolah dan sekolah menengah keatas (SMA) mengalami kejadian stroke. Tingkat Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas manusia atau sebagai pola pikir untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang makan akan semakin bagus pola pikir hidupnya (Pajri et al., 2018).

g) Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian Pajri et al (2018), menyatakan bahwa stroke terjadi pada penderita bekerja tidak tetap dengan mayoritas sebagai pegawai swasta. Hal tersebut dinyatakan karena seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan maka akan mengalami stress karena memikirkan bagaimana cara mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan.

2) Medis

a) Hipertensi

Menurut hasil penelitian Martono et al (2022), hipertensi memiliki hubungan dengan kejadian stroke usia produktif. Peningkatan tekanan darah yang tidak normal dan terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri kemudian mendorong pengendapan plak di arteri dan mengganggu aliran darah ke otak sehingga dapat menyumbat atau memecahkan pembuluh darah di otak.

b) Merokok atau terpapar asap rokok

Menurut penelitian Gusmiati & Fernanda (2019), menyatakan bahwa merokok merupakan salah satu faktor risiko terbesar terjangkit stroke, karena dalam rokok mengandung berbagai racun dari bahan kimia yang menyebabkan kanker (racun karsinogen) dan karbonmonoksida pada asap rokok yang dapat merusak sistem fungsional tubuh dan pembuluh darah.

c) Diabetes Mellitus (DM)

Berdasarkan hasil penelitian Martono et al (2022), menyatakan bahwa penderita DM dan kejadian stroke dapat disebabkan oleh riwayat keluarga dengan DM dan diperparah oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi banyak makanan yang manis, fast food (cepat saji), dan tidak proporsional dengan olahraga teratur atau cenderung tidak teratur.

d) Penyintas stroke

e) Penyakit kardiovaskular (gagal jantung, cacat jantung, infeksi jantung atau irama jantung yang tidak normal)

f) Transient Ischaemic Attack (TIA/ serangan iskemik sementara)

b. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi:

1) Usia

Pada penelitian Martono et al (2022), menyatakan bahwa usia tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial. Kejadian stroke mampu terjadi pada usia lanjut maupun usia muda. Akan tetapi, berdasarkan teori semakin meningkatnya usia seseorang maka hal tersebut berpengaruh pada penurunan daya fungsi tubuh (degenerasi) salah satunya penurunan elastisitas pembuluh darah yang beresiko terhadap kejadian stroke (Martono et al., 2022). Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya stroke usia muda karena menurut hasil penelitian Wardhani & Martini (2014), menyatakan bahwa peristiwa kejadian stroke dapat dilihat mulai usia 15 tahun sebab tingkat pengetahuan usia muda cenderung kurang yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi kejadian stroke usia dewasa.

2) Ras

Menurut hasil penelitian (Pajri et al., 2018), menyatakan bahwa di Indonesia khususnya suku Batak dan Padang lebih rentan terserang stroke dibandingkan suku lainnya karena pengonsumsi jenis makanan yang didominasi mengandung kolesterol. Dan menurut Haryono & Utami (2019) menyatakan bahwa orang Afrika-Amerika memiliki risiko stroke yang lebih tinggi karena konsumsi alkohol yang lebih banyak daripada ras lainnya.

3) Jenis kelamin

Menurut penelitian Martono et al (2022), menyatakan bahwa ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian stroke. Dimana laki-laki berpotensi terjangkit stroke daripada perempuan, karena faktor risiko stroke bersifat multifaktoral. Pada laki-laki yaitu kebiasaan merokok dan minum alkohol yang lebih dominan, sementara perempuan pascamenopause beresiko lebih tinggi terjangkit stroke karena penurunan produksi hormon estrogen (Martono et al., 2022).

4) Riwayat keluarga

Keluarga (orang tua, saudara) yang pernah mengalami stroke pada usia muda yang bersangkutan beresiko tinggi terserang stroke juga.

4. Patofisiologi Stroke

Menurut Haryono & Utami (2019), perjalanan terjadinya stroke yang paling utama yaitu penyakit kardiovaskular. Manifestasi sekunder di otak adalah hasil dari faktor risiko. Patologi utama termasuk tekanan darah tinggi, penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke penyakit arteri koroner, dislipidemia, penyakit jantung, dan hiperlipidemia. Ada dua jenis stroke yang dapat terjadi, yaitu:

a. Stroke iskemik

Stroke iskemik atau stroke penyumbatan terjadi karena oklusi cepat dan mendadak pada pembuluh darah otak sehingga aliran darah terganggu. Jaringan otak yang kekurangan oksigen selama lebih dari 60 sampai 90 detik akan menyebabkan penurunan fungsi di otak tersebut. Thrombus atau penyumbatan seperti aterosklerosis dapat menyebabkan iskemia pada jaringan otak sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan neuron sekitarnya sebagai dampak dari hipoksia dan anoksia. Sumbatan emboli yang terbentuk di daerah sirkulasi lain dalam sistem peredaran darah yang biasa terjadi di dalam jantung atau sebagai komplikasi dari fibrilasi atrium yang terlepas dan masuk ke sirkulasi darah otak, dapat pula mengganggu sistem sirkulasi otak (Haryono & Utami, 2019).

Oklusi akut pada pembuluh darah otak membuat daerah otak terbagi menjadi dua daerah keparahan derajat otak, yaitu daerah inti dan area penumbra (area disekitar titik serangan stroke). Daerah inti merupakan

ibagian otak yang memiliki aliran darah kurang dari 100cc/100g jaringan otak tiap menit sehingga bagian tersebut berisiko menjadi nekrosis dalam hitungan menit. Sedangkan daerah penumbra merupakan bagian otak yang aliran darahnya terganggu akan tetapi masih lebih baik daripada inti karena bagian tersebut masih mendapatkan supply pernafusi dari pembuluh darah lainnya. Daerah penumbra memiliki aliran darah 100cc-25cc/100g jaringan otak tiap menit. Daerah penumbra memiliki prognosis lebih baik daripada bagian inti. (Haryono & Utami, 2019). Defisit neurologis dari stroke iskemik terjadi bukan hanya dari luas bagian inti dan penumbra saja, akan tetapi juga sebab dari isumbatan yang mengakibatkan aterosklerosis ivaskular (vasospasme).

Kerusakan jaringan otak akibat dari oklusi (tersumbatnya aliran darah) merupakan proses biomolekuler yang bersifat cepat dan progresif pada tingkat selular, proses tersebut disebut sebagai kaskade iskemik (Ischaemic Cascade). Setelah aliran darah terganggu, jaringan menjadi kekurangan oksigen dan glukosa yang menjadi sumber utama energi untuk menjalankan proses potensial membran. Sebab dari kekurangan energi tersebut mengakibatkan area yang kekurangan oksigen dan gula darah melakukan metabolisme anaerob (Haryono & Utami, 2019).

b. Stroke Hemoragik

Stroke hemoragik terjadi karena pecahnya pembuluh darah yang disertai ekstrasvasi darah ke parenkim otak akibat penyebab non-traumatis. Stroke perdarahan sering terjadi pada pembuluh darah yang melema. Mayoritas penyebab kelemahan pembuluh darah adalah aneurysm dan malformasi arteriovenous (AVM). Ekstrasvasi darah ke parenkim otak mampu merusak jaringan sekitar sebab kompresi jaringan akibat dari perluasan hematoma. Faktor predisposisi dari stroke hemoragik yang sering terjadi adalah hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu faktor hemodinamika kronis yang menjadikan pembuluh darah mengalami perubahan struktur atau kerusakan ivascular. Perubahan struktur yang terjadi meliputi lapisan elastis eksternal dan lapisan adventisia yang membuat pembuluh darah menipis, sehingga jika terjadi peningkatan pembuluh darah mendadak dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah.

Estimasi proses ekstrasvasi darah ke parenkim otak bagian dalam terjadi beberapa jam, apabila kejadiannya luas maka akan mempengaruhi jaringan sekitar sehingga mengalami peningkatan tekanan intracranial (TIK). TIK menjadi penyebab kurangnya suplai darah ke jaringan yang berdampak dan mengakibatkan terjadinya infark. Begitu pula, darah yang keluar selama ekstrasvasi mempunyai efek toksik pada jaringan otak sehingga menyebabkan peradangan jaringan otak. Peradangan jaringan otak memiliki efek terhadap cedera otak sekunder setelah kejadian perdarahan. Proses dan onset yang cepat pada stroke hemoragik yang cepat, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat pula untuk meminimalisir keparahan (Lanzino, 2012) dalam (Haryono & Utami, 2019).

5. Manifestasi Klinis Stroke

Menurut Doenges et al (2021), adapun tanda dan gejala yang bisa langsung tampak saat awal kejadian stroke menyerang adalah sebagai berikut:

a. Gangguan kesadaran seperti:

- 1) Penurunan kesadaran hingga tidak sadar
- 2) Sakit kepala dengan atau tanpa disertai muntah
- 3) Sulit berkonsentrasi
- 4) Kejadian disorientasi
- 5) Kebingungan
- 6) Selalu mengantuk
- 7) Sulit mengingat
- 8) Penglihatan kabur

b. Penurunan kekuatan otot serta kehilangan koordinasi seperti:

- 1) Bicara pelou (tidak jelas)
- 2) Kesulitan membaca dan mendengar (seseorang yang terserang stroke akan mengalami kesukasan mengucapkan kata-kata dan/atau memahami ucapan orang lain),
- 3) Kesulitan menyusun kata-kata, kesulitan beraktivitas seperti berdiri, berjalan, mengambil/memegang benda (apa yang dipegang akan jatuh/lepas dari genggaman).

c. Kelumpuhan di lengan, kaki, dan wajah. Pengidap stroke dapat mengalami mati rasa mendadak, kelemahan, hingga kelumpuhan di sebagian wajah, lengan, atau kaki.

6. Tingkat Keparahan Stroke

Adapun dimensi penilaian tingkat keparahan stroke dapat diklasifikasikan dari aspek fungsi bahasa, motorik, sensorik, kesadaran, lapangan pandang, gerakan ekstraokular, koordinasi, pengabaian (neglect), serta bicara (Bugge et al., 2022; NIH STROKE SCALE, 2021). Adapun skala dari skor pemeriksaan melalui lembar observasi NIHSS yaitu ada 42 poin. Interpretasi NIHSS yang peneliti adopsi dari hasil penelitian Sekeon & Kambuan (2015) telah dilakukan cut off point menjadi 3 interpretasi skor yang didapatkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Deficit neurologis ringan (<5),
- b. Deficit neurologis sedang (6 – 15),
- c. Deficit neurologis berat (>15)

7. Alat Ukur Tingkat Keparahan Stroke

Penggunaan instrument penilaian tingkat keparahan stroke dengan National Institute Health of Stroke Scale (NIHSS) yang diadopsi dari penelitian Sekeon & Kembuan (2015), karena peneliti ingin melihat tingkat keparahan stroke yang di derita oleh responden dalam penelitian. Terdapat 9 dimensi penilaian dan 11 item pertanyaan yang diobservasi oleh peneliti, dengan interpretasi skor sebagai berikut:

- a. Deficit neurologis ringan <5
- b. Deficit neurologis sedang 6 – 15
- c. Deficit neurologis berat >15

B. Konsep Pola Makan

1. Definisi Pola Makan

Menurut Depkes RI (2014), menyatakan bahwa pola makan merupakan perilaku penting yang sangat mempengaruhi keadaan gizi, hal tersebut disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Hutagalung (2019), menyatakan bahwa pola makan dikenal sebagai kebiasaan makan seseorang. Menurut Astuti et al (2022), pola makan sebagai suatu metode dalam menyusun porsi dan jenis makanan dalam suatu makanan yang bermanfaat guna mempertahankan tubuh supaya tetap sehat, status gizi yang baik bagi seseorang, serta mencegah terserang penyakit. Adapun menurut Kumar (2015), pola makan merupakan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang dalam frekuensi dan jangka waktu tertentu.

2. Klasifikasi Pola Makan

a. Pola Makan Sehat

Menurut Naibaho (2022), menyatakan bahwa pola makan sehat merupakan pola makan baik yang mengandung makanan pokok, lauk-pauk, buah-buahan, dan sayuran, serta dikonsumsi dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan. Pola makan yang baik dan pemilihan jenis makanan yang beragam dapat menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur bagi kebutuhan gizi seseorang, sehingga status gizinya akan lebih baik serta meningkatkan imunitas tubuh supaya terhindar dari serangan penyakit.

Adapun menurut Naviri (2015), menyatakan bahwa WHO merekomendasikan kelompok makanan terbaik dalam mengendalikan asupan lemak jenuh yang diganti menjadi lemak tak jenuh dalam lima makanan terbaik, yaitu:

- 1) Buah yaitu berupa pepaya, stroberi, jeruk kupas, kiwi, manga, plum, kesemek, dan semangka
- 2) Sayur yaitu berupa ketela kuning (kaya akan kandungan vitamin dan antikanker, juga merupakan golongan sayur utama), asparagus, lettuce (selada air), brokoli, seledri, terong, bit, wortel, kol, umbi, xuelihong (sejenis sawi hijau), dan sawi putih.
- 3) Daging yaitu struktur daging angsa menyerupai minyak zaitun dan bermanfaat untuk jantung. Daging angsa mendapat predikat sumber protein terbaik.
- 4) Makanan tersehat untuk otak, yaitu kacang (soybean oleacea), kacang polong, tomat, wortel, sawi putih kecil, daun bawang, seledri, kacang tanah, jambu mete, biji tusam, biji apricot, kedelai, dan beras kasar/tuton.
- 5) Tim atau sup. Tim ayam diklaim sebagai sup terbaik, terutama ayam betina karena dapat mencegah flu, radang tenggorokan, dan cocok dikonsumsi saat musim dingin atau semi.

b. Pola Makan Tidak Sehat

Menurut Iffah (2021), pola makan tidak sehat merupakan kebiasaan pemilihan dalam mengonsumsi makanan sehari-hari yang tidak terdapat nilai gizi dalam makanan tersebut. Adapun pola makan yang tidak sehat akan mempengaruhi energi yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh. Jika metabolisme tubuh terganggu, hal tersebut mempengaruhi fungsional daripada kerja organ tubuh manusia. Pola makan yang tidak sehat dapat dipicu karena dua faktor yaitu faktor kebiasaan makan dalam porsi banyak dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak sehat karena kebiasaan yang tidak teratur dapat terjadi sebab pemilihan seseorang dalam mengonsumsi makanan (Hutagalung, 2019).

Adapun menurut Naviri (2015), menyatakan bahwa WHO menganggap sepuluh golongan makanan yang diklaim tidak sehat (junk food), yaitu:

1) Gorengan

Gorengan merupakan makanan dengan kandungan tinggi kalori dan lemak/minyak dan oksida yang sama tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, gorengan mampu menyebabkan obesitas, dan masalah jantung koroner. Dalam proses menggoreng, lumrah terjadi proses karsinogenik yang terbukti berhubungan dengan kanker jika dikonsumsi secara berlebihan.

2) Makanan kalengan

Makanan kalengan termasuk buah atau daging kalengan diklaim memiliki kandungan gizi yang sudah rusak. Kandungan protein didalamnya telah mengalami perubahan sifat hingga penyerapannya lebih lambat dan nilai gizinya jauh berkurang.

3) Makanan asinan

Dalam proses pengasinan makanan membutuhkan banyak penambahan garam. Hal tersebut menyebabkan jumlah garam yang berlebihan yang dapat mengganggu fungsi ginjal sehingga konsumen pun beresiko terkena hipertensi. Selain itu, proses pengasinan sering menambahkan ammonium nitrit yang menyebabkan peningkatan bahaya kanker hidung dan tenggorokan. Kadar garam tinggi pun mampu merusak selaput lender, lambung, dan usus. Konsumen rutin makanan asinan beresiko lebih tinggi terkena radang lambung dan usus.

4) Daging yang diproses

Makanan berupa daging yang diproses termasuk ham, sosis, dan sejenisnya mengandung garam nitrit yang mampu menyebabkan kanker, juga mengandung bahan pengawet/pewarna dan lainnya yang membebaskan fungsi hati Ketika dikonsumsi.

5) Daging berlemak dan jeroan

Walau mengandung protein baik, vitamin, dan mineral, namun daging berlemak dan jeroan juga mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang diklaim sebagai factor terjadinya penyakit jantung. Mengonsumsi jeroan hewan dalam jumlah berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama mampu menyebabkan penyakit jantung coroner serta tumor ganas (kanker usus besar), kanker payudara, dll.

6) Olahan keju

Mengonsumsi olahan keju yang berlebihan mampu meningkatkan berat badan dan peningkatan gula darah.

7) Mie instan

Mie instan diklaim sebagai golongan makanan dengan kadar tinggi garam tetapi miskin mineral dan vitamin. Kadar tinggi garam dalam mie instan menyebabkan peningkatan beban fungsi ginjal, meningkatnya tekanan darah, dan memberatkan beban fungsi pembuluh darah jantung.

8) Makanan yang dipanggang/dibakar

Makanan yang dipanggang atau dibakar diklaim dalam jenis makanan yang tidak sehat, karena mengandung zat pencetus kanker.

9) Sajian manis beku

Makanan yang masuk dalam kategori diantaranya yaitu es krim, kue beku, dan sejenisnya. Sajian makanan beku termasuk makanan tidak sehat, karena mengandung tinggi mentega penyebab obesitas, kadar tinggi gula menyebabkan penurunan nafsu makan, dan temperature yang rendah mempengaruhi fungsi usus.

10) Manisan kering

Manisan kering mengandung garam nitrat, ketika dikonsumsi, garam nitrat dalam tubuh akan terkombinasi dengan ammonium sehingga menghasilkan zat karsinogenik yang buruk bagi tubuh. Selain itu, manisan kering juga mengandung tinggi garam yang menyebabkan peningkatan tekanan darah serta memberatkan kerja ginjal.

3. Factor Yang Mempengaruhi Pola Makan

Menurut iSulistyoningsih (2011), factor yang mempengaruhi terbentuknya ipola imakan ipada iindividu isecara iiumum, iyaitu:

a. Factor iEkonomi

Ekonomi idapat imempengaruhi ipada ipola imakan iindividu ikarena imencakup idalam ipeluang idaya ibeli ipangan idengan ikuantitas iyang ibanyak inamun ikualitas iyang ikurang. iMayoritas imasyarakat ilebih imengutamakan pemilihan imakanan iberdasarkan iselera idibandingkan idari iaspek igizi.

b. Factor iSosial iBudaya

Factor sosial ibudaya idapat imempengaruhi ipantangan idalam imengonsumsi ijenis imakanan isesuai ikepercayaan ibudaya idat iderah itersebut iyang isudah imenjadi ikebiasaan (adat). iDalam ibudaya imemiliki imetode ipola imakan iseperti imakanan iyang iboleh idan itidak iboleh idikonsumsi, ibagaimana ipengolahan imakanan ihingga ipersiapan idan ipenyajian imakanan.

c. Pendidikan

Factor iPendidikan ipada ipola imakan iyaitu imencakup ipengetahuan iyang idipelajari iterhadap ipemilihan ibahan imakanan iserta ipenentuan ikebutuhan igizi ibagi ifungsional itubuh.

d. Lingkungan i

Factor ilingkungan ipada ipola imakan iyaitu iadanya ipengaruh iterhadap ipembentukan iperilaku imakan iberupa ilingkungan ikeluarga imelalui iadanya ipromosi, imedia ielektronik, idan imedia icetak idalam ipenentuan iatau ipemilihan idalam imengonsumsi imakanan.

e. Kebiasaan iMakan

Adapun ifactor ikebiasaan imakan ipada ipola imakan imerupakan icara iindividu iyang imemiliki iketerbiasaan imakan imeliputi ijumlah, ifrekuensi, idan ijenis imakanan iyang idikonsumsi

4. Instrumen Penilaian Pola Makan

Alasan penggunaan alat ukur pola makan ini yaitu karena instrument ini dijadikan acuan dalam penilaian pola responden sebelum stroke. Adapun dari hasil penelitian Kristiyawati (2008), pola makan dapat dinilai melalui kuisioner yang berisi 111 item/38 pertanyaan dengan judul Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Stroke di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, dengan interpretasi skor sebagai berikut:

- a. Skor 38 – 114 = Pola Makan Sehat
- b. Skor 115 – 228 = Pola Makan Tidak Sehat

C. Konsep Usia Dewasa

Istilah dewasa menurut Maulidya et al (2018), yaitu merupakan organism yang sudah matang yang merujuk kepada manusia. Dewasa merupakan individu yang bukan anak-anak lagi dimana individu tersebut telah menjadi seorang pria atau wanita sepenuhnya. Fase dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu karena pada masa tersebut seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk bisa mandiri.

Menurut Ahadiyanto (2021), menyatakan bahwa istilah dewasa yaitu merupakan individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Dalam budaya di negara Amerika, seorang anak belum resmi dianggap dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun. Namun, saat ini usia 18 tahun merupakan usia dimana seseorang dianggap dewasa secara sah. Seiring meningkatnya lamanya hidup atau panjangnya usia rerata seseorang, maka masa dewasa saat ini mencakup waktu yang paling lama dalam rentang hidup (Ahadiyanto, 2021).

Adapun klasifikasi dewasa menurut Elizabeth B. Hurlock (1991) dalam Sudirjo & Alif (2018), dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Fase dewasa awal yaitu merupakan rentang kehidupan yang terpenting (masa produktif) dengan periode rentang usia 18 – 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa kematangan dan masa reproduktif yang dikatakan sebagai masa penuh masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru.
2. Dewasa madya yaitu berlangsung dari usia 41 – 60 tahun. Ciri-cirinya terkait pribadi dan sosial, yaitu merupakan masa transisi, dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku dewasa awal dan memasuki periode kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Konsentrasi terhadap agama lebih mendominasi dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan terkadang minat dan perhatiannya terhadap agama dilandasi dengan kebutuhan pribadi dan sosial.

D. Kerangka Teori

Klasifikasi Stroke (Haryono & Utami, 2019):

1. Stroke Iskemik
2. Stroke Hemoragik

Klasifikasi Usia (Sudirjo & Alif, 2018):

1. Infant: baru lahir – 2 tahun
2. Toddler: 3 – 5 tahun
3. Sekolah 6 – 12 tahun
4. Remaja: 13 – 20 tahun
5. Dewasa awal: 18 – 40 tahun
6. Dewasa madya: 41 – 60 tahun
7. Lansia: >60 tahun

Tingkat keparahan stroke (Sekeon & Kembuan, 2015):

Berdasarkan hasil score perhitungan

1. <5 ringan
2. 6 - 15 sedang
3. >15 berat

Factor-faktor yang Mempengaruhi Stroke (Pinzon & Asanti, 2020):

1. Yang dapat dimodifikasi:
 - a. Gaya hidup
 - 1) Obesitas
 - 2) Sedentary
 - 3) Alkoholisme
 - 4) Pola makan konsumsi lemak dan kolesterol tinggi
 - 5) Konsumsi obat-obatan terlarang (kokain dan amfetamin/ganja)

Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber: iSudirjo i& iAlif, i(2018), iPinzon i& iAsanti, i(2020), iHaryono i& iUtami i(2019), iJojang iet ial i(2016). i

2

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA PENELITIAN

Dalam iBab iini ipenulis iakan imenjabarkan imengenai ikerangka ikonsep idan ihipotesa iterkait ihal iyang iakan iditeliti. iAdapun iuraian itersebut iterdiri idari ipembahasan ikerangka ikonseptual idan ipembahasan ihipotesa ipenelitian.

A. Kerangka Konsep Penelitian

Dalam ipenelitian iini ivariable iindependentnya iadalah iPola iMakan idan ivariable idependennya iadalah iTingkat iKeparahan iStroke. iSehingga idalam ikerangka ikonseptual iini ipeneliti iingin imengetahui ihubungan ipola imakan idengan itingkat ikeparahan stroke pasien dewasa.

Variabel Independen

Variabel Dependen

Tingkat Keparahan Stroke

Pola Makan

Variable Confounding

* Usia

* Jenis Kelamin

* Pendidikan

* Pekerjaan

Gambar 3. 1 Cross Sectional

Keterangan:

: iVariabel iyang iditeliti

: iVariabel iyang itidak iditeliti

B. Hipotesis Penelitian

Adapun ihipotesis idari ipenelitian iini imemiliki ipraduga: iHo iditolak iatau iHo igagal iditolak. iDengan ipenetapan ihipotesis istatistic isebagai iberikut:

Ha: iAda ihubungan iantara ipola imakan idengan itingkat ikeparahan istroke pasien dewasa di RSUD X Bekasi

H0: iTidak iada ihubungan iantara ipola imakan idengan itingkat ikeparahan istroke pasien dewasa di RSUD X Bekasi
2

Dalam iBab iini ipenulis iakan imenjabarkan imengenai imetode ipeneltitian iterkait ihal iyang iakan iditeliti. iAdapun iuraian itersebut iterdiri idari idesign ipenelitian, ivariable ipenelitian, idefinisi ioperasional, ipopulasi idan isampel, ilokasi idan iwaktu ipenelitian, iinstrument ipeneltian, uji ivaliditas idan ireliabilitas, ialur ipenelitian, ipengelolaan idan iAnalisa idata, iAnalisa idata, idan ietika ipenelitian.

A. Desain Penelitian

Desain ipenelitian iadalah isuatu irancangan iyang idisusun iguna imemcahkan imasalah idalam ipenelitian. iKeputusan imengenai iapa, idimana, ikapan, iberapa ibanyak, idengan icara iapa, iyang ihubungan idengan ipenyelidikan iatau istudi ipenelitian imerupakan ibagian idari idesain ipenelitian. iDesain ipenelitian imerupakan iregulasi ikondisi iuntuk ipengumpulan idan ianalisis idata idengan itujuan imenggabungkan ihubungan iantara itujuan ipenelitian iterhadap iprosedur iyang ilebih isederhana. iDengan ibegitu, idesain ipenelitian idapat idikatakan imencakup igaris ibesar iterhadap iapa iyang iakan ipeneliti ilakukan idari ipenetapan ihipotesis idan iimplikasi ioperasionalnya iterhadap ianalisis iakhir idata i(Rosyidah i& iFijra, i2021).

Metode ipenelitian iyang ipeneliti igunakan iyaitu imetode ipenelitian ikuantitatif (pengukuran ijumlah iatau ikauntitas) iini iberlaku iuntuk ifenomena iyang idapat idiungkapkan idalam ihal ikuantitas. iDesain ipenelitian iyang ipeneliti igunakan iyaitu iCross iSectional, idimana idalam ipenelitian iini ipeneliti iingin imelihat ihubungan iantara iPola iMakan idengan iTingkat iKeparahan Stroke iyang idiidentifikasi idalam isatu iwaktu.

B. Variabel Penelitian

Menurut iDharma i(2019), ivariable imerupakan ikarakteristik iyang iterikat ipada ipopulasi, isangat ibervariasi iantara isatu iorang idengan iyang ilainnya iserta iditeliti idalam isebuah ipenelitian. Variabel ipenelitian idikembangkan idari ikonsep/teori iserta ihasil ipenelitian iterdahulu isesuai idengan iadanya ifenomena iatau imasalah ipenelitian. idalam ipenelitian iterdapat ibeberapa ijenis ivariable iberdasarkan ihubungan isebab-akibat iantara ibeberapa ivariable itersebut, iyaitu:

1. Variable ibebas i(independent ivariable) idisebut ijuga isebagai ivariable isebab iyaitu imerupakan ikarakteristik idari isubjek iyang ikeberadaannya imenjadi ipenyebab iberubahnya ivariable ilain. iVariable ibebas idalam ipenelitian iini iadalah ipola imakan.

2. Variaber iterikat i(dependent ivariable) iyaitu ivariable iakibat iatau ivariable iyang iakan iberubah iakibat idair ipengaruh iatau iperubahan iyang iterjadi ipada ivariable iindependent. iVariabel iterikat idalam ipenelitian iini iadalah itingkat ikeparahan istroke.

3. Variable iperancu i(confounding ivariable) iyaitu ivariable ilain iyang ihubungan ibaik iterhadap ivariable iindependent iatau ivariable idependen, iadanya ivariable iperancu iakan imempengaruhi ihubungan iantara ikedua ivariable i(independent idan idependen) isehingga iperlu idiidentifikasi isecara ikonseptual, idikendalikan iketika

menentukan kriteria sampel penelitian atau dikendalikan ketika uji statistik pada data hasil penelitian. (Pajri et al., 2018)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Dharma (2019) yaitu mendeskripsikan atau menghubungkan variabel penelitian. Sehingga penting untuk menjabarkan variabel penelitian, seperti beberapa variabel yang diteliti, jenis variabel, definisi konseptual dan operasional, hingga bagaimana melakukan pengukuran/penilaian terhadap variabel.

Tabel 4. 1 Definisi Operasional

No

Variable Penelitian

Definisi Operasional

Cara Ukur

Alat Ukur

Hasil Ukur

Skala Ukur

Karakteristik Responden

1

Jenis Kelamin

Membedakan antara laki-laki dan perempuan

Pengisian kuesioner

Kuesioner

1. Laki-laki

2. Perempuan

(Sivitriana, 2020)

Nominal

2

Usia

Umur responden saat pertama kali didiagnosa menderita stroke

Pengisian kuesioner

Kuesioner

1. Dewasa awal 18 – 40 tahun

2. Dewasa madya 41 – 60 tahun

(Sudirjo & Alif, 2018)

Ordinal

3

Pendidikan

Jenjang Pendidikan formal responden yang sudah ditempuh hingga mendapatkan ijazah

Pengisian kuesioner

Kuesioner

1. Tidak Sekolah

2. SD

3. SMP

4. SMA

5. Perguruan Tinggi

(Pajri et al., 2018)

Ordinal

4

Pekerjaan

Kegiatan yang dilakukan responden untuk membiayai hidup dan kebutuhan sehari-hari

Pengisian kuesioner

Kuesioner

1. Tidak Bekerja

2. Swasta

3. Wiraswasta

4. PNS

(Pajri et al., 2018)

Nominal

Variable Independent

5

Pola iMakan

Jenis dan ifrekuensi imakanan iyang ibiasa idikonsumsi responden ipada iwaktu itertentu

Pengisian ikuesioner i

Kuesioner penelitian sebelumnya dengan 11 item/38 pertanyaan

Interpretasi iskor:

1. 38 – 114 = pola makan sehat

2. 115 – 228 = pola makan tidak sehat

(Kristiyawati, 2008)

Ordinal

Variable iDependent

6

Tingkat iKeparahan iStroke

Level keparahan stroke responden

Observasi oleh peneliti

Lembar observasi iNational iInstitute iHealth iof iStroke iScale i(NIHSS) idengan i11 iitem ipenilaian

Interpretasi iskor:

1. <5 Ringan

2. 6 - 15 Sedang

3. >15 Berat

(Sekeon & Kembuan, 2015)

Ordinal

D. Populasi dan Sampel

Menurut iRosyidah i& iFijra i(2021), idalam ipenelitian ikuantitatif iselalu idibutuhkan ipopulasi, isebab itujuan ipenelitian ikuantitatif iadalah iguna imenyimpulkan ikarakteristik ipopulasi iberdasarkan isampel iyang iditeliti.

1. Populasi i

Populasi iadalah isesuatu iyang imenjabarkan iobjek ipenelitian imengenai ikarakteristik iatau isifat iyang idimiliki ioleh iobjek ipenelitian (Rosyidah i& iFijra, i2021). Populasi idalam penelitian ini yaitu 380 pasien stroke yang dirawat di ruang rawat inap RSUD X Bekasi.

2. Sampel i

Pengertian isample iadalah imerupakan ibagian idari ipopulasi iyang ididapatkan idengan icara itertentu ikemudian idianggap imenjadi iwakil idari ipopulasi iyang imenjadi ifocus idalam ipenelitian i(Rosyidah i& iFijra, i2021). iPengambilan isampel idalam penelitian ini yaitu idilakukan idengan icara inon iprobability isampling melalui iteknik ipurposive isampling, iyaitu ipengambilan isampel idilakukan iberdasarkan imaksud idan itujuan itertentu iyang iditentukan ioleh ipeneliti. iHal itersebut iterjadi ikarena ipeneliti imenganggap ibahwa iorang itersebut imemiliki iinformasi iyang ipeneliti ibutuhkan i(Dharma, i2019). iPenetapan ijumlah isample imenurut iDahlan, i(2016) idalam ipenelitian ini iyaitu dengan rumus iperhitungan yang ditetapkan berdasarkan besar isample iAnalitik iKorelatif iOrdinal-Ordinal, isebagai iberikut: i

$J^2 + i3$

n i = iNilai isubjek

α i(alpha) = ikesalahan itipe isatu iditetapkan i5%

$Z\alpha$ = inilai istandard ialpha i= i1,64

β i(beta) = ikesalahan itipe idua iditetapkan i10%

$Z\beta$ = inilai istandard ibeta i= i1,28

r = ikorelasi ikoeffisien 0,412 (Dahlan, 2016)

$J^2 + i3$

$J^2 + i3$

$J^2 + i3$

$J^2 + i3$

$(5,24^2) + 3 = 27,45 + 3 = 30,4$ idibulatkan isehingga imenjadi i30 iresponden idalam isampel

Keterangan:

N: iBesar ipopulasi

n: iBesar isampel

d: iDerajat ipenyimpangan ipada ipopulasi iyang idiinginkan i(5%)

r: Korelasi koefisien yang dianggap bermakna yaitu >0,4

(Dahlan, 2016)

Kriteria iInklusi:

a. Pasien istroke dengan kesadaran penuh

- b. Usia idewasa (18 – i60 itahun)
- c. Pasien rawat inap

Kriteria iEksklusi:

- a. Pasien istroke iyang koma
- b. Lanjut usia (lansia) >60 tahun
- c. Pasien iyang irawat ijalan

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan idi iRSUD X Bekasi yang berlokasi di jalan Pramuka No. 55, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141. iPenelitian idimulai dari bulan Juni isampai iJuli i2023 yang dilaksanakan di Ruang Rawat Inap Sakura dan Cathleya. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena melihat dari fenomena yang didapat bahwa terdapat pasien dewasa rentang usia 18 – 60 tahun sudah mengalami stroke yang diduga sebab dari faktor pola makan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam iprosedur ipenelitian imenyusun iinstrumen imerupakan ihal iterpenting iyang iharus ipeneliti igunakan. iInstrumen iadalah ialat ibantu idalam ipengumpulan idata iyang idibutuhkan i(Rosyidah i& iFijra, i2021). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa iangket iatau ikuesioner. iMetode iobservasi iinstrumen yang digunakan i berupa lembar checklist.

Adapun ijenis iinstrument i(bahan idan ialat) idalam ipenelitian iini i berupa:

1. Kuesioner

Metode ipengumpulan idata iinstrumennya idisebut isesuai idengan inama imetodenya. iBentuknya i berupa ilembaran iangket i berisi i beberapa ipertanyaan itertulis, ibertujuan iguna imendapatkan iinformasi dari riwayat pola makan iresponden imengenai iapa iyang idialami iserta iketahui. Dalam ipenelitian iini imenggunakan i3 ikuesioner, iyaitu:

a. Kuesioner Karakteristik Responden

Kuesioner iini i berisi iinformasi idari ikarakteristik iidentitas iresponden. iBerupa ipertanyaan iyang imeliputi inama, jenis kelamin, usia, Pendidikan, dan pekerjaan.

b. Kuesioner Penilaian Pola Imakan I

Kuesioner penilaian pola makan yang digunakan peneliti diadopsi idari penelitian sebelumnya (Kristiyawati, 2008). Kuesioner berisi ipengetahuan iresponden iyang idiukur idengan i11 item/38 ipertanyaan, idengan 6 ipilihan ijawaban, iyaitu:

Responden yang menjawab

- 1. “Tidak pernah” akan diberi skor 1
- 2. “Kadang-kadang” akan diberi skor 2
- 3. “1x /minggu” akan diberi skor 3
- 4. “2-3x /minggu” akan diberi skor 4
- 5. “4-5x /minggu” akan diberi skor 5
- 6. “Setiap hari” akan diberi skor 6

Interpretasi skor, yaitu:

- 1. Skor 38 – 114 = Pola Makan Sehat
- 2. Skor 115 – 228 = Pola Makan Tidak Sehat

c. Lembar Observasi Tingkat Keparahan Stroke

Lembar observasi tingkat keparahan stroke yang digunakan peneliti di adopsi idari (Sekeon & Kembuan, 2015) terdiri idari i11 iitem ipemeriksaan, imeliputi itingkat ikesadaran, igerakan imata ikonjugat ihorizontal, ilapang ipandang ipada ites ikonfrontasi, ikelumpuhan iwajah, igangguan ifungsi imotoric itangan idan ikaki, iataksia iekstremitas, isensorik, iafasia, idysarthria, ipengabaian i(neglect) idan ipenurunan iperhatian i(inattention). Dimana peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap responden dengan cara menilai kondisi responden menggunakan alat bantu lembar observasi yaitu, lembar penilaian, media observasi 1, media observasi 2, dan media observasi 3 (Anandika, 2023). NIHSS imemiliki iskor imaksimum i42 idan iskor iminimum i0. iAdapun iinterpretasi idari iNIHSS, iyaitu:

* Skor <5 = iRingan

* Skor 6 – 15 = iSedang i

* Skor >15 = iBerat

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji instrumen dilakukan dua tahap, yaitu:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument

a. Instrumen yang digunakan untuk menilai pola makan yaitu berupa lembar kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada responden yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. Uji coba telah dilakukan Kristiyawati, (2008), pada 30 responden yang menderita stroke di RS Telogorejo Semarang, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument dengan bantuan computer. Didapatkan hasil nilai r hitung lebih besar dari r table (df = 28, r table = 0,361), sehingga semua soal dinyatakan valid. Nilai r hitung terkecil hingga terbesar yaitu 0,397 –

0,943. Hasil uji reliabilitas diperoleh Cronbach's Alpha sebesar 0,938, sehingga kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

b. Instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan stroke yaitu berupa lembar observasi NIHSS yang terstandarisasi atau merupakan instrumen baku. Hasil uji validitas yang dilakukan oleh peneliti Dancer et al (2009), menyatakan bahwa Corrected Item-Total Correlation yaitu 0,979, merupakan validitas tinggi. Adapun hasil uji reliabilitas dalam statistik yaitu 0,854 – 1,075. Lembar observasi NIHSS telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan dimasukkan dalam Guidelines Stroke yang dibuat dan direkomendasikan untuk dijadikan pedoman tatalaksana oleh Pimpinan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI) (Kolegium Neurologi Indonesia, 2009) dalam (Rachmat, 2018).

H. Alur Penelitian

Menemukan Fenomena

Menyusun Proposal Penelitian

Pengurusan izin tempat penelitian dan izin dari STIKes Mitra Keluarga

Uji Etik

Sidang Proposal Penelitian

Mengidentifikasi sampel penelitian berdasarkan kriteria inklusi

Pelaksanaan penelitian

Pengolahan data dan Analisa data dengan tahap editing, coding scoring, tabulating, dan skrining

Menyusun laporan penelitian

Membuat manuskrip

Publikasi

Gambar 4. 1 Skema Alur Penelitian

I. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Sebagai jawaban dari pertanyaan peneliti tentang cara menghubungkan data yang sudah ada dengan kuesioner sesuai tujuan penelitian. Kemudian data yang masih mentah (raw data) akan diproses sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan guna menjawab tujuan penelitian (Hastanto, 2020). Supaya analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, maka setidaknya perlu pengolahan data dengan empat tahapan, yaitu:

a. Editing

Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau kuesioner apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah:

- 1) Lengkap: seluruh pertanyaan sudah terjawab
- 2) Jelas: jawaban dari pertanyaan cukup jelas dan terbaca
- 3) Relevan: jawaban yang tertulis sudah sesuai dengan pertanyaan
- 4) Konsisten: seluruh pertanyaan berkaitan isi jawabannya konsisten.

b. Coding

Coding merupakan kegiatan mengubah data dari bentuk huruf menjadi angka atau disebut sebagai pengkodean. Fungsi dari coding yaitu guna mempermudah saat menganalisis data dan mempercepat saat entry data.

Dalam penelitian ini digunakan pengkodean sebagai berikut:

a. Data umum (karakteristik responden)

Jenis kelamin, kode:

1 = Laki-laki

2 = Perempuan

Usia, kode:

1 = 18 – 40 tahun

2 = 41 – 60 tahun

Pendidikan, kode:

1 = Tidak Sekolah

2 = SD

3 = SMP

4 = SMA

5 = Perguruan Tinggi

Pekerjaan, kode:

1 = Tidak Bekerja

2 = Swasta

3 = Wiraswasta

4 = PNS

6 Kuesioner Pola Makan, kode:

Interpretasi iskor:

1 = 38 – 114 Pola Makan Sehat

2 = 115 – 228 Pola Makan Tidak Sehat

7 Lembar Observasi iTingkat iKeparahan iStroke i(NIHSS):

Interpretasi iscore:

1 = <5 Ringan

2 = 6 – 15 Sedang

3 = >15 Berat

c. Processing

Setelah iseluruh ikuesioner iterisi ipenuh idan ibenar idan isudah imelalui ipengkodean, imaka iselanjutnya iyaitu imemproses idata isupaya idata iyang isudah idi-entry idapat idianalisis. iPemrosesan idata idilakukan idengan icara imeng-entry idata idari ikuesioner idan ihasil iobservasi ike ipaket iprogram icomputer. iTerdapat iberagam ipaket iprogram iyang ibisa idigunakan idalam ipemrosesan idata idengan imasing-masing ikelebihan idan ikekurangannya. iSalah isatu ipaket iprogram iyang iumum idigunakan iuntuk ientry idata idalah ipaket iprogram iSPSS 25.0 for iWindow.

d. Tabulasi.

Pada tahap ini data dimasukkan (input), dihitung, dan menghitung data yang telah dikodekan ke dalam table.

e. Cleaning i

Cleaning (pembersihan idata) imerupakan ikegiatan ipengecekan iKembali idata iyang isudah idi ientry iapakah iterdapat ikesalahan iatau itidak. iKesalahan ikemungkinan iterjadi isaat ipeneliti ientry ike icomputer. iContoh, iuntuk ivariable itingkat ikeparahan istroke ihemoragik iada idata idengan inilai i3, iharusnya iberdasarkan icoding iyang iada ikodnya ihanya i0 idan il i(0 i= ijarang/tidak ipernah idan il i= iselalu).

2. Analisa Data

Menurut iHastanto i(2020) ianalisa idata imerupakan iproses iyang ipenting idalam isuatu ipenelitian, ikarena idengan imenganalisis idata imaka ipeneliti iakan idapat ijawaban idari isuatu imasalah i(pemecahan imasalah) ipenelitian. iSetelah imelakukan ipengolahan idata, imaka iselanjutnya imenganalisis idata imentah iyang isudah iterkumpul. iDengan ilangkah isebagai iberikut:

a. Analisis iUnivariat

Tujuan idari ianalisis iini idalah iuntuk imendeskripsikan ikarakteristik itiap ivariable iyang iditeliti. iBentuknya itergantung idari ijenis idatanya. iPenelitian iini imemiliki ikarakteristik ivariable iPola iMakan idan iTingkat iKeparahan iStroke idengan iskala iukur iordinal-ordinal. iVariable iUsia, jenis kelamin, dan hipertensi dengan skala ukur kategorik dan dianalisis secara distribusi frekuensi.

b. Analisis iBivariat

Setelah diketahui karakteristik tiap variable, kemudian dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat hubungan antar dua variable pada tingkat bivariat. Adapun analisis bivariat dalam penelitian ini yaitu, pola makan sebagai variable independent (mempengaruhi) dan tingkat keparahan stroke sebagai variable dependen (dipengaruhi). Dengan skala pengukuran kategorik-kategorik yang merupakan penelitian independent atau dilakukan pada sekali pengukuran dalam satu waktu oleh peneliti yang akan dianalisis melalui Uji Chi-Square.

J. Etika Penelitian

Menurut iDharma i(2019), ipenelitian idengan imenggunakan imanusia isebagai isubjek ipenelitian isudah iseharusnya imendapatkan ipersetujuan ietik i(ethical iclearance) idari ikomite ietik ipenelitian iyaitu ipenelitian itelah imelalui itelaah ikomite ietik idan idinyatakan ibebas idari ipermasalahan ietik iyang idapat imerugikan imanusia isebagai isubjek ipenelitian. iAdapun ietika ipenelitian imemiliki iempat iprinsip iutama, iyaitu:

1. Menghormati iharkat idan imartabat imanusia (respect ifor ihuman idignity)

Subjek iberbhak imemilih iuntuk iikut iatau imenolak ipenelitian i(autonomy) idan itidak iboleh iada ipaksaan iatau ipenekanan itertentu isupaya isubjek imau iikut idalam ipenelitian. iSubjek ijuga iberbhak imendapatkan iinformasi iterbuka idan ilengkap imengenai ipelaksanaan ipenelitian imeliputi itujuan idan imanfaat ipenelitian, iprosedur ipenelitian, iresiko ipenelitian, ikeuntungan iyang imungkin ididapat idan ikerahasiaan iinformasi. iPrinsip itersebut iterdapat idalam iinformed iconsent iyaitu ipersetujuan iuntuk iberpartisipasi isebagai isubjek ipenelitian isetelah imendapatkan ipenjelasan iyang ilengkap idan iterbuka idari ipeneliti imengenai ikeseluruhan ipelaksanaan ipenelitian.

2. Menghormati iprivasi idan ikerahasiaan isubjek (respect ifor iprivacy iand iconfidentiality)

Dengan idilakukannya ipenelitian iberpotensi iterbukanya iinformasi itentang isubjek, isehingga ipeneliti iperlu imerahasiakan iberbagai iinformasi iyang imenyangkut iprivasi isubjek isupaya iidentitas idan isegala iinformasi isubjek itidak idiketahui iorang ilain. iPrinsip itersebut idapat iberupa ipenerapan iseperti inama idan ialamat idiganti imenjadi ikode itertentu.

3. Menghormati ikeadilan idan iinklusi/tidak mendiskriminasi (respect ifor ijjustice iand iinclusiveness) i

Prinsip iketerbukaan idalam ipenelitian ibermakna ipenelitian idilakukan isecara ijujur, itepat, icermat, iberhati-hati, iserta idilakukan isecara iprofessional.

4. Memperhitungkan imanafaat idan ikerugian iyang iditimbulkan i(balancing ibenefits iand iharm)

Setiap ipenelitian iharus imempertimbangkan imanafaat isebesar-besarnya ibagi isubjek ipenelitian idan ipopulasi idimana ihasil ipenelitian iakan iditerapkan i(beneficience). iLalu imeminimalisir iresiko/dampak iyang imerugikan ibagi isubjek ipenelitian i(nonmaleficience). iPenelitian iini ibermanfaat iuntuk imelihat ihubungan iantara ipola imakan itidak isehat idengan itingkat ikeparahan istroke ihemoragik iterhadap idewasa imuda.

Bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian tentang hubungan pola makan dengan tingkat keparahan stroke pasien dewasa di RS X Bekasi dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dengan hasil penelitian sebelumnya.

A. Hasil Analisis Univariat

Analisis univariat disusun untuk menjelaskan karakteristik responden, distribusi frekuensi variabel pola makan dan tingkat keparahan stroke pasien dewasa

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan pasien stroke rawat inap ruang Sakura dan Catthleya yang dapat dilihat dari table 5.1

Table 5.1

Distribusi Frekuensi Karkateristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan Pasien Stroke di RS X Bekasi (n=30)

Variabel	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis kelamin		
Laki-laki	16	53,3
Perempuan	14	46,7
Total	30	100
Usia		
Dewasa Awal (18 – 40)	4	13,3
Dewasa Madya (41 – 60)	26	86,7
Total	30	100
Pendidikan		
Tidak sekolah	9	30
SD	10	33,3
SMP	9	30
SMA	2	6,7
Perguruan Tinggi	-	-
Total	30	100

30
 100
 Pekerjaan
 Tidak bekerja
 Swasta
 Wiraswasta
 PNS
 15
 6
 8
 1
 50
 20
 26,7
 3,3
 Total
 30
 100

*Uji Distribusi Frecuency

Berdasarkan table 5.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden didominasi oleh laki-laki yaitu 16 orang (53,3%) dan perempuan 14 orang (46,7%). Kemudian, jumlah responden dalam rentang usia 41 – 60 tahun ada 26 orang (86,7%) dan rentang usia 18 – 40 tahun ada 4 orang (13,3%). Lebih lanjut, jumlah responden dalam tingkat pendidikan SMP yaitu ada 10 orang (33,3%), SD 9 orang (30%), SMA 9 orang (30%), perguruan tinggi 2 orang (6,7%), dan tidak sekolah tidak ada. Lalu, jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan yang tidak bekerja yaitu ada 15 orang (50%), wiraswasta 8 orang (26,7%), swasta 6 orang (20%), dan PNS 1 orang (3,3%).

2. Pola Makan Pasien Stroke Usia Dewasa di RS X Bekasi

Table 5.2

Distribusi Frekuensi Tentang Pola Makan Pasien Stroke Dewasa di RS X Bekasi (n=30)

Pola Makan
 Frekuensi (n)
 Persentase (%)
 Sehat
 23
 76,7
 Tidak Sehat
 7
 23,3
 Jumlah
 30
 100

*Uji Distibusi Frekuensi

Berdasarkan table 5.2 dapat diektahui bahwa jumlah responden yang menerapkan pola makan sehat yaitu sebanyak 23 orang (76,7), sedangkan yang menerapkan pola makan tidak sehat yaitu ada 7 orang (23,3%).

3. Tingkat Keparahan Stroke Pasien Usia Dewasa di RS X Bekasi

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Tingkat Keparahan Stroke Pasien Dewasa di RS X Bekasi (n=30)

Tingkat Keparahan Stroke
 Frekuensi (n)
 Persentase (%)
 Ringan
 16
 53,3
 Sedang
 11
 36,7
 Berat
 3
 10

Jumlah

30

100

*Uji Distribusi Frecuence

Berdasarkan table 5.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan tingkat keparahan stroke ringan yaitu 16 orang (53,3%), tingkat keparahan stroke sedang ada 11 orang (36,7%), dan tingkat keparahan stroke berat yaitu 3 orang (10%).

B. Hasil Analisis Bivariat

Analisis bivariat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan pola makan dengan tingkat keparahan stroke pasien dewasa di RSUD X Bekasi. Uji korelasi yang digunakan yaitu uji Chi-Square. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada table 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4

Tabel Silang Pola Makan dengan Tingkat Keparahan Stroke Pasien Dewasa di RS X Bekasi Tahun 2023 (n=30)

Tingkat Keparahan Stroke

Total

r

P value

Pola Makan

Ringan

Sedang

Berat

n

%

n

%

n

%

N

%

Sehat

10

43,5

10

43,5

3

13,0

23

100

0,134

0,185

Tidak Sehat

6

85,7

1

14,3

0

0

7

100

Total

16

53,3

11

36,7

3

10

30

100

*Uji Chi Square Post Hoc Kendall's Tau-C

Berdasarkan table 5.4 diatas menunjuk dari 30 jumlah responden yang menerapkan pola makan sehat memiliki tingkat keparahan stroke ringan yaitu 10 orang (43,5%), tingkat keparahan stroke sedang yaitu 10 orang (43,5%), dan tingkat keparahan stroke berat yaitu 3 orang (13,0%). Lebih lanjut, dari 7 responden yang menerapkan pola makan tidak sehat memiliki tingkat keparahan stroke ringan yaitu 6 orang (85,7%), tingkat keparahan stroke sedang yaitu 1 orang (14,3%), sedangkan untul tingkat keparahan stroke berat yaitu tidak ada. Hasil uji Fisher's Exact diperoleh nilai p-value yaitu $0,185 > \alpha 0,05$ dan analisis koefisien korelasi dengan menggunakan uji Kendall's tau-c yaitu $0,134$ ($r=0,134$). Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara pola makan dengan tingkat keparahan stroke pasien dewasa di RSUD X Bekasi dan memiliki keeratan korelasi atau hubungan yang lemah (weak correlation).

Pembahasan hasil penelitian tentang hubungan pola makan dengan tingkat keparahan stroke pasien dewasa di ruang rawat inap yang digambarkan guna membandingkan hasil yang diperoleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

A. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang dengan karakteristik meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan

1) Jenis Kelamin

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian yang dilakukan di RSUD X Bekasi ini yaitu mayoritas laki-laki. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian penelitian Martono et al (2022), yang menyatakan bahwa responden stroke didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Begitu juga dengan hasil penelitian Maukar & Kundre (2019), yang menyatakan bahwa stroke didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yang diyakini bahwa laki-laki cenderung merokok yang dapat merusak lapisan dari pembuluh darah. Sedangkan, menurut hasil penelitian Purwaningtiyas (2019), menyatakan bahwa responden perempuan mendominasi kejadian stroke. Berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Hamzah et al (2021), stroke pada laki-laki dapat terjadi sebab faktor hormonal yang tidak dimiliki oleh laki-laki dan hanya dimiliki oleh perempuan yaitu hormon estrogen dan progesteron. Menurut McCullough (2018), menyatakan bahwa pada perempuan sebelum menopause masih terlindungi oleh hormon estrogen yang mampu meminimalisir keparahan stroke. Dapat disimpulkan, bahwa jenis kelamin laki-laki dapat mempengaruhi tingkat keparahan stroke sejak dini karena faktor hormonal yang memicu kejadian stroke daripada perempuan dalam usia dewasa sebelum menopause.

2) Usia

Distribusi frekuensi berdasarkan usia responden dalam penelitian yang dilakukan di RSUD X Bekasi ini mayoritas usia dewasa madya (41 – 60 tahun). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Martono et al (2022), yang menyatakan bahwa responden stroke didominasi oleh usia dewasa madya. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Budi et al (2019), yang menyatakan bahwa stroke pada usia produktif dapat terjadi sebab perubahan pola hidup khususnya di kawasan perkotaan yang modern karena era globalisasi sehingga lebih mudah memperoleh informasi. Menurut teori yang dinyatakan oleh Hermanto (2021), bahwa usia dewasa muda dan dewasa tua (25 – 60 tahun) yaitu terkategori sebagai usia produktif dengan tingginya aktivitas fisik, dimana juga merupakan faktor presipitasi stroke karena kebiasaan hidup dan pola makan yang sembarangan. Dapat disimpulkan bahwa stroke yang biasa menjangkit usia lanjut (lansia) kini telah menjarah usia produktif yaitu dewasa awal dan dewasa madya karena perubahan gaya hidup (lifestyle).

3) Pendidikan

Distribusi frekuensi berdasarkan Pendidikan responden dalam penelitian yang dilakukan di RSUD X Bekasi ini mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Khotimah et al (2023), yang menyatakan bahwa mayoritas Pendidikan responden dengan tingkat Pendidikan SD. Sedangkan, hasil penelitian dari Pajri et al (2018), menyatakan bahwa mayoritas dari tingkat Pendidikan SMA. Berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Yueniwati (2015), bahwa pendidikan sangat mempengaruhi perilaku gaya hidup seseorang dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diharapkan mampu mengubah perilaku kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan pola hidupnya.

4) Pekerjaan

Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan responden dalam penelitian yang dilakukan di RSUD X Bekasi ini mayoritas tidak bekerja. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Khotimah et al (2023), bahwa responden stroke didominasi oleh yang tidak bekerja. Hasil dari penelitian Kirana et.al (2021), juga menyatakan bahwa pasien stroke didominasi oleh tidak bekerja. Sedangkan menurut hasil penelitian Pajri et al (2018), menyatakan bahwa jenis pekerjaan swasta yang mendominasi stroke. Berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Yueniwati (2015), mengenai pekerjaan yaitu sebagai indikator status ekonomi sosial sehingga seseorang yang tidak bekerja akan mengalami stress karena tidak adanya pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak bekerja akan mempengaruhi kesehatan seseorang yang

menyebabkan stress karena tidak bekerja dan kurangnya aktivitas yang dilakukan.

5) Karakteristik Pola Makan

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai pola makan responden stroke yang dirawat inap RSUD X Bekasi didapatkan bahwa mayoritas menerapkan pola makan sehat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hartaty & Haris (2020), yang menyatakan stroke dengan pola makan baik lebih mendominasi. Begitu juga, menurut hasil penelitian Maukar & Kundre (2019), menyatakan bahwa pengidap stroke mayoritas menerapkan pola makan yang baik. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Subramaniam (2014), yang menyatakan bahwa mayoritas pola makan kurang baik yang mendominasi stroke.

Menurut Depkes RI (2014), menyatakan bahwa pola makan merupakan perilaku penting yang sangat mempengaruhi status gizi, hal tersebut disebabkan karena kuantitas serta kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi juga status kesehatan individu dan masyarakat. Naibaho (2022), menyatakan bahwa pola makan isehat merupakan pola makan baik yang mengandung makanan pokok, sayur-pauk, buah-buahan, dan sayuran, serta dikonsumsi dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan. Pola makan yang baik dan pemilihan jenis makanan yang beragam dapat menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur bagi kebutuhan gizi seseorang, sehingga status gizinya akan lebih baik serta meningkatkan kekebalan tubuh supaya terhindar dari serangan penyakit. Dapat disimpulkan bahwa pola makan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, dimana seseorang yang menerapkan pola makan sehat akan memiliki kondisi kesehatan yang mampu meminimalisir tingkat kesakitan.

6) Karakteristik Tingkat Keparahan Stroke

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai tingkat keparahan stroke responden yang dirawat inap RSUD X Bekasi didapatkan bahwa mayoritas mengalami tingkat keparahan stroke ringan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Razdiq & Imran (2020), yang menyatakan bahwa mayoritas pasien stroke memiliki tingkat keparahan stroke ringan. Lebih lanjut, hasil tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Kirana et al (2021), yang menyatakan bahwa mayoritas pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Jakarta yaitu merupakan stroke ringan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Subramaniam (2014), yang menyatakan bahwa mayoritas tingkat keparahan stroke responden mengalami stroke berat. Menurut Rachmat (2018), menyatakan bahwa tingkat keparahan stroke merupakan derajat (level) keparahan deficit neurologis yang diderita pasien stroke. Menurut Kirana et al (2021), menyatakan bahwa kejadian stroke ringan bisa terjadi karena sumbatan atau perdarahan fokal pada arteri otak sehingga peredaran darah daerah tersebut terganggu yang menyebabkan disfungsi neurologis dalam waktu yang singkat. Dapat disimpulkan bahwa tingkat keparahan stroke bisa dinilai dari kerusakan jaringan yang dialami, semakin luas atau parah kerusakan jaringan maka semakin kurang pasokan oksigen yang di supply ke daerah tersebut yang menyebabkan terjadinya defisit neurologis.

2. Analisis Bivariat

Hubungan Pola Makan dengan Tingkat Keparahan Stroke Pasien Dewasa di RSUD X Bekasi

Hasil penelitian ini menjelaskan tidak ada hubungan antara Pola Makan dengan Tingkat Keparahan Stroke Pasien Dewasa di RSUD X Bekasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lavados et al (2020), yang menyatakan bahwa pola makan tidak mempengaruhi tingkat keparahan stroke dengan mayoritas perilaku pasien stroke menerapkan pola makan sehat dan didapatkan hasil bahwa nilai NIHSS yaitu rendah yang menunjukkan bahwa tingkat keparahan stroke berarti ringan. Hal tersebut terjadi karena pasien stroke mayoritas menerapkan pola makan sehat akan tetapi kejadian stroke bisa jadi dipicu karena faktor lain yaitu mayoritas terbiasa sedentary, obesitas, dan konsumsi alkohol yang berlebihan (Lavados et al., 2020). Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian dari Dai et al (2018), yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola makan sebelum sakit dengan tingkat keparahan stroke yang dialami ketika terdiagnosis karena sebagian besar pasien menerapkan pola makan sehat dengan rata-rata mengonsumsi makanan dengan protein cukup sehingga derajat keparahan stroke berdasarkan anamnesa NIHSS yang diderita pun tidak menunjukkan nilai tinggi. Lebih lanjut, faktor penyebab stroke dengan tingkat keparahan ringan ini juga bisa terjadi karena pengaruh dari hipertensi (Dai et al., 2018).

Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam (2014), yang menyatakan bahwa pola makan dengan tingkat keparahan stroke memiliki hubungan yang signifikan terhadap seluruh responden dengan menunjukkan pola makan pasien stroke yang tidak sehat, begitupun dengan tingkat keparahan stroke yang didapatkan yaitu berat. Lebih lanjut, hal tersebut terjadi karena mayoritas responden sering mengonsumsi olahan santan, jajanan yang berminyak atau gorengan, makanan siap saji (fast food), camilan (snack), daging, dan juga kopi (Subramaniam, 2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari sebagian jumlah keseluruhan responden mengalami stroke ringan. Hal tersebut karena responden menyatakan bahwa ketika mengalami tanda gejala stroke keluarganya langsung membawa responden ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kesehatannya sehingga bisa langsung mendapatkan penanganan oleh ahlinya terkait tanda gejala yang dirasakan. Adapun kebiasaan konsumsi makanan responden yaitu mayoritas didominasi oleh nasi, kacang tanah, telur ayam atau bebek, kemudian disusul oleh daging sapi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Dai et al (2018), yang menyatakan bahwa mayoritas intake pasien stroke yaitu

mengonsumsi kacang-kacangan, telur, dan juga daging merah karena dari makanan tersebut memiliki komponen protein yang bermanfaat untuk memperbaiki fungsi kestabilan tubuh. Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian Lavados et al (2020), yang menyatakan bahwa mayoritas pasien stroke memiliki riwayat pola makan yang sehat dengan mengonsumsi lima jenis buah dan sayur dalam sehari. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Subramaniam (2014), yang menyatakan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol seperti olahan santan, daging, jajanan yang berminyak (gorengan), camilan, dan makanan cepat saji dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh, yang mana dapat menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah sehingga mengakibatkan penurunan elastisitas dinding pembuluh darah (aterosklerosis) yang menjadi pemicu stroke.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara pola makan dengan tingkat keparahan stroke karena mayoritas asupan konsumsi makanan pasien stroke yaitu memilih serta membatasi, disisi lain juga karena mayoritas responden telah berpengetahuan tentang asupan (jumlah dan frekuensi) makanan yang sehat dan kurang sehat bagi tubuh, oleh sebab itu pasien stroke hanya mengalami tingkat keparahan stroke ringan dan sedang.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan atau hambatan yang peneliti temukan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Penelitian ini terbatas yang hanya mendapatkan sampel berjumlah 30 responden dan hanya pasien stroke yang dirawat inap yang diikutsertakan.
2. Peneliti hanya menilai satu variabel yaitu pola makan dari beberapa faktor lain yang bisa menunjang tingkat keparahan stroke.
3. Kuesioner yang digunakan peneliti yaitu merupakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya dan sudah dilakukan uji validitas serta reliabilitas dengan hasil yang tinggi dan tidak dimodifikasi oleh peneliti, sehingga tidak ada kebaruan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dari penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul hubungan pola makan dengan tingkat keparahan stroke pasien dewasa rawat inap di RSUD X Bekasi dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Pasien stroke di ruang rawat inap RSUD X Bekasi mayoritas berjenis kelamin laki-laki, didominasi oleh rentang usia 41 – 60 tahun (dewasa madya), sebagian besar tingkat pendidikan Sekolah Dasar, dan tidak bekerja.
2. Pasien stroke di ruang rawat inap RSUD X Bekasi mayoritas menerapkan pola makan sehat.
3. Pasien stroke di ruang rawat inap RSUD X Bekasi mayoritas mengalami tingkat keparahan stroke ringan.
4. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan uji Chi Square menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara pola makan dengan tingkat keparahan stroke terhadap pasien usia dewasa awal dan madya di ruang rawat inap RSUD X Bekasi dan juga memiliki hubungan yang lemah.

B. Saran

Saran yang peneliti dapat sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Perawat

Diharapkan bagi perawat yang berdinan di ruang rawat inap untuk bisa menindaklanjuti dengan edukasi rencana tindak lanjut (discharge planning) bagi responden yang sudah selesai menjalani masa perawatan di rumah sakit.

2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan bagi rumah sakit agar bisa menjadikan faktor pola makan ini sebagai acuan untuk kebijakan prosedur pola diet bagi pasien di rumah sakit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mengembangkan lagi penelitian ini menggunakan variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan stroke pada pasien dewasa (awal dan madya) seperti hipertensi, sedentary (kurang aktivitas fisik), merokok, obesitas, dan alkoholisme. Begitu juga agar penelitian selanjutnya bisa memodifikasi kuesioner pola makan dengan mengelompokkan jenis makanan pokok, makanan cepat saji, dan jajanan supaya bisa lebih fokus pada gaya hidup mayoritas usia dewasa masa kini.

LAMPIRAN

2

0.11%

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada anak usia 3-8 tahun di TK dan SD Budi Mulia Dua Seturan Yogyakarta tahun 2017. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey analitik menggunakan pendekatan waktu cross sectional. Metode pengambilan sampel

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada anak usia 3-8 tahun di TK dan SD Budi Mulia Dua Seturan Yogyakarta tahun 2017. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey analitik menggunakan pendekatan waktu cross sectional. Metode pengambilan sampel

0.11%

METODE Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau sering disebut penelitian survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara yang beralamat di Jl. Pemuda No.81, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418.

METODE Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau sering disebut penelitian survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara yang beralamat di Jl. Pemuda No.81, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418.

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/7406/1064>

0.11%

by N Sulistyarini · Cited by 5 — Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif dan dengan desain penelitian cross sectional study. by M Elysa — Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif dan dengan desain penelitian cross sectional. Data dalam penelitian ini diambil ...

by N Sulistyarini · Cited by 5 — Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif dan dengan desain penelitian cross sectional study. by M Elysa — Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif dan dengan desain penelitian cross sectional. Data dalam penelitian ini diambil ...

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24266>

0.11%

by H Nikijuluw · 2018 · Cited by 2 — Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia dan kejadian kanker kolorektal ($p=0,97$), ...

by H Nikijuluw · 2018 · Cited by 2 — Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia dan kejadian kanker kolorektal ($p=0,97$), ...

<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/865>

0.11%

This study aims to determine the relationship between diet and hypertension. Method: This study is a literature review article that looks for the relationship between diet as an independent variable on hypertension as the dependent variable. Articles were obtained from the Google Scholar database with predetermined keywords and inclusion and ...

This study aims to determine the relationship between diet and hypertension. Method: This study is a literature review article that looks for the relationship between diet as an independent variable on hypertension as the dependent variable. Articles were obtained from the Google Scholar database with predetermined keywords and inclusion and ...

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi/article/view/34932>

0.11%

The type of research in this research is descriptive-analytical, an analysis that only reaches the level of description, namely analyzing and presenting ...

The type of research in this research is descriptive-analytical, an analysis that only reaches the level of description, namely analyzing and presenting ...

<https://www.lawinsider.com/clause/research-method>

0.11%

by U Laili · 2020 — Then the data were analyzed using SPSS with the chi square test. 3. RESULTS. The results of this study showed that the majority of mothers during their ...

by U Laili · 2020 — Then the data were analyzed using SPSS with the chi square test. 3. RESULTS. The results of this study showed that the majority of mothers during their ...

0.11%

Findings. The results of this study indicate that there is a significant and negative association between asymmetric trust and project management performance. Moreover, two types of knowledge sharing (explicit knowledge sharing and tacit knowledge sharing) have different degrees of impact on improving project management performance. In addition ...

Findings. The results of this study indicate that there is a significant and negative association between asymmetric trust and project management performance. Moreover, two types of knowledge sharing (explicit knowledge sharing and tacit knowledge sharing) have different degrees of impact on improving project management performance. In addition ...

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-05-2022-0400/full/html>

0.11%

... p enderita yang tidak mendapatkan pekerjaan maka akan mengalami stress karena memikirkan bagai mana cara mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan, ...

... p enderita yang tidak mendapatkan pekerjaan maka akan mengalami stress karena memikirkan bagaimana cara mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan, ...

<https://docplayer.info/88407483-Gambaran-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-stroke-abstract.html>

0.11%

by MMH TAMBA · Cited by 5 — Di Indonesia sendiri, suku Batak dan Padang lebih rentan terserang stroke dibandingkan suku jawa, hal ini disebabkan oleh pola dan jenis. by DJE Sihaloho — Di Indonesia sendiri, suku Batak dan Padang lebih rentan terserang stroke dibandingkan suku jawa, hal ini disebabkan oleh pola dan jenis.

by MMH TAMBA · Cited by 5 — Di Indonesia sendiri, suku Batak dan Padang lebih rentan terserang stroke dibandingkan suku jawa, hal ini disebabkan oleh pola dan jenis. by DJE Sihaloho — Di Indonesia sendiri, suku Batak dan Padang lebih rentan terserang stroke dibandingkan suku jawa, hal ini disebabkan oleh pola dan jenis.

<https://repository.stikeselisabethmedan.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/MARIA-MELISA-HARDIKA-TAMBA-012016015.pdf>

0.32%

Apr 28, 2022 — Daging angsa mendapat predikat sumber protein terbaik. Makanan tersehat untuk kesehatan otak: Poci (soinancia oleracea), kucai, labu merah, ...

Apr 28, 2022 — Daging angsa mendapat predikat sumber protein terbaik. Makanan tersehat untuk kesehatan otak: Poci (soinancia oleracea), kucai, labu merah, ...

<https://mading.id/perspektif/inilah-jenis-makanan-terbaik-versi-who>

0.11%

Apr 17, 2011 — Banyak makan sayur, buah, kacang kacangan , makanan kasar dll. ... biji tusam, biji apricot, kedelai, beras kasar/tuton, hati babi.

Apr 17, 2011 — Banyak makan sayur, buah, kacang kacangan , makanan kasar dll. ... biji tusam, biji apricot, kedelai, beras kasar/tuton, hati babi.

<https://www.kompasiana.com/els766hi/5500b126813311eb18fa7bc1/makanan-yang-terbaik-dan-makanan-yang-terburuk-data-who>

0.21%

Selain itu, kandungan proteinnya telah mengalami perubahan sifat, hingga penyerapannya lebih lambat dan nilai gizinya jauh berkurang.

Selain itu, kandungan proteinnya telah mengalami perubahan sifat, hingga penyerapannya lebih lambat dan nilai gizinya jauh berkurang.

<https://www.naviri.org/2016/08/makanan-terbaik-dan-makanan-terburuk.html>

0.11%

... dalam jumlah banyak dan waktu lama dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan tumor ganas (kanker usus besar), kanker payudara dll. 6. Olahan Keju

... dalam jumlah banyak dan waktu lama dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan tumor ganas (kanker usus besar), kanker payudara dll. 6. Olahan Keju

<https://m.tribunnews.com/ramadan/2013/07/16/selama-puasa-katakan-tidak-pada-junk-food>

0.11%

Analisis Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stroke Di Rumah Sakit Panti. Wilasa Citarum Semarang xiv + 113 hal + 2 skema + 22 tabel + 7 lampiran. Analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stroke di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang = Analysis of risk factors related with stroke ...

Analisis Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stroke Di Rumah Sakit Panti. Wilasa Citarum Semarang xiv + 113 hal + 2 skema + 22 tabel + 7 lampiran. Analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stroke di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang = Analysis of risk factors related with stroke ...

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-10/20438070-Sri%20Puguh%20Kristiyawati.pdf>

0.11%

Jun 26, 2021 — bisa melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk bisa mandiri. Salah satu upaya individu dalam mengokohkan ...

Jun 26, 2021 — bisa melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk bisa mandiri. Salah satu upaya individu dalam mengokohkan ...

<https://id.scribd.com/document/514161039/Laporan-Psikoedukasi-Quarter-Life-Crisis>

0.11%

Sep 11, 2021 — ... individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa yang lain.

Sep 11, 2021 — ... individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa yang lain.

<https://www.kajianpustaka.com/2021/09/dewasa-muda.html>

0.11%

Jun 21, 2021 — ... periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada ola hidup ...

Jun 21, 2021 — ... periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada ola hidup ...

<http://www.hariantemanggung.com/2021/06/masa-dewasa-awal-di-zaman-serba-digital.html>

0.11%

masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umurnya antara 21 tahun sampai 40 tahun. b. Masa dewasa madya (middle adulthood) UNIVERSITAS MEDAN AREA

masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umurnya antara 21 tahun sampai 40 tahun. b. Masa dewasa madya (middle adulthood) UNIVERSITAS MEDAN AREA

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1970/5/128600385_file5.pdf

0.11%

Dewasa awal (18-40 tahun) 41 77,4 24 42,9 65 59,6 Dewasa madya (41-60 tahun) 11 20,8 26 46,4 37 33,9 Dewasa akhir (≥61 tahun) 1 1,9 6 10,7 7 6,4.

Dewasa awal (18-40 tahun) 41 77,4 24 42,9 65 59,6 Dewasa madya (41-60 tahun) 11 20,8 26 46,4 37 33,9 Dewasa akhir (≥61 tahun) 1 1,9 6 10,7 7 6,4.

<https://123dok.com/document/zg692knq-hasil-gambaran-umum-lokasi-penelitian.html>

0.11%

by SH Negoro · 2013 — 2. Dewasa Madya: 41-60 tahun. 3. Dewasa lanjut: di atas 60 tahun c. Pendidikan. Pendidikan (Tyas, 2012:36) adalah suatu usaha untuk.

by SH Negoro · 2013 — 2. Dewasa Madya: 41-60 tahun. 3. Dewasa lanjut: di atas 60 tahun c. Pendidikan. Pendidikan (Tyas, 2012:36) adalah suatu usaha untuk.

<http://e-journal.uajy.ac.id/270/2/1KOM03473.pdf>

0.11%

alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena melihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi bahwa peserta didik masih kurang berminat dan ...

alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena melihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi bahwa peserta didik masih kurang berminat dan ...

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17577/1/SUKMAWATI_80200217049.pdf

0.11%

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner. Angket atau kuisisioner digunakan untuk memperoleh data mengenai. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang di distribusikan langsung pada responden.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner. Angket atau kuisisioner digunakan untuk memperoleh data mengenai. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang di distribusikan langsung pada responden.

http://repository.upi.edu/23325/6/S_PKK_1103606_Chapter3.pdf

0.11%

3. Alternatif jawaban Ragu-ragu atau C akan diberi skor 3, yang menunjukkan jawaban yang tidak netral. 4. Alternatif jawaban Tidak Setuju atau D akan diberi skor ...

3. Alternatif jawaban Ragu-ragu atau C akan diberi skor 3, yang menunjukkan jawaban yang tidak netral. 4. Alternatif jawaban Tidak Setuju atau D akan diberi skor ...

<http://digilib.unila.ac.id/13034/11/BAB%20III.pdf>

0.11%

Mar 18, 2016 — Sebuah liga sepak bola antar kampung memutuskan bahwa tim yang menang akan diberi nilai 3, tetapi bila kalah diberi nilai -2 dan bila seri ...

Mar 18, 2016 — Sebuah liga sepak bola antar kampung memutuskan bahwa tim yang menang akan diberi nilai 3, tetapi bila kalah diberi nilai -2 dan bila seri ...

<https://brainly.co.id/tugas/5492702>

0.11%

by AA Anandita · 2018 · Cited by 2 — Aspek motorik terdiri dari melambannya respon gerakan setiap hari dibandingkan ... Pada respon aitem unfavorable akan diberi skor 6 untuk STS, 5 untuk TS, ...

by AA Anandita · 2018 · Cited by 2 — Aspek motorik terdiri dari melambannya respon gerakan setiap hari dibandingkan ... Pada respon aitem unfavorable akan diberi skor 6 untuk STS, 5 untuk TS, ...

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6236/SKRIPSI%20FIX.docx?sequence=1>

0.11%

by AC Ummah · 2015 · Cited by 23 — didapatkan hasil nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r tabel untuk n = 30 adalah 0,361), yaitu memiliki nilai antara 0.372-0,721 hal ini. by AS Hutomo · 2016 · Cited by 4 — 17 Uji validitas didapatkan hasil nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r tabel untuk n = 30 adalah 0,361) memiliki nilai antara 0.395- ...

by AC Ummah · 2015 · Cited by 23 — didapatkan hasil nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r tabel untuk n = 30 adalah 0,361), yaitu memiliki nilai antara 0.372-0,721 hal ini.by AS Hutomo · 2016 · Cited by 4 — 17 Uji validitas didapatkan hasil nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r tabel untuk n = 30 adalah 0,361) memiliki nilai antara 0.395- ...

http://eprints.undip.ac.id/49561/4/BAB_3_Hubungan_Kebutuhan_Spiritual_dengan_Kualitas_Hidup_Pada_Lansia_di_Panti_Wredha_Kota_Semarang.pdf

0.11%

NIHSS ini sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dimasukkan dalam Guidelines Stroke yang dibuat dan direkomendasikan untuk dijadikan pedoman tatalaksana oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Nilai NIHSS adalah antara 0 – 42.

NIHSS ini sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dimasukkan dalam Guidelines Stroke yang dibuat dan direkomendasikan untuk dijadikan pedoman tatalaksana oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Nilai NIHSS adalah antara 0 – 42.

<https://123dok.com/article/pemantauan-dengan-skala-stroke-nihss-barthel-modified-rankin.y694vv7y>

0.11%

May 9, 2020 — Pembahasan juga perlu dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dengan hasil penelitian sebelumnya, ...

May 9, 2020 — Pembahasan juga perlu dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dengan hasil penelitian sebelumnya, ...

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hasil-pembahasan-penelitian/132180>

0.11%

by NK Mariasih · 2021 — 1) Karakteristik, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. 2) Sosial, dengan berinteraksi dengan makhluk social akan mempengaruhi.

by NK Mariasih · 2021 — 1) Karakteristik, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. 2) Sosial, dengan berinteraksi dengan makhluk social akan mempengaruhi.

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/8177/3/3.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

0.11%

Kuantitas serta kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh tetap sehat dan ...

Kuantitas serta kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh tetap sehat dan ...

<https://pdfcoffee.com/makalah-nutrasetika--pdf-free.html>

0.11%

by FP Rari · 2022 · Cited by 5 — Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wang & Wong. (2014) yang menyebutkan bahwa waktu luang memiliki peran penting dalam.

by FP Rari · 2022 · Cited by 5 — Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wang & Wong. (2014) yang menyebutkan bahwa waktu luang memiliki peran penting dalam.

<https://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/download/254/112>

0.11%

Kolesterol Kandungan lemak yang berlebih dalam darah dapat menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah, sehingga mengakibatkan pembuluh ...Kolesterol Kandungan lemak yang berlebih dalam darah dapat menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah, sehingga mengakibatkan pembuluh ...

Kolesterol Kandungan lemak yang berlebih dalam darah dapat menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah, sehingga mengakibatkan pembuluh ...Kolesterol Kandungan lemak yang berlebih dalam darah dapat menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah, sehingga mengakibatkan pembuluh ...

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-pelita-bangsa/gmb-physics/bab-ii-tinjauan-pustaka-tinjauan-pustaka/44270249>