

Nama Mahasiswa : Nisma Ajeng Virianti  
NIM : 201701032  
Program Studi : Diploma III Keperawatan  
Judul Karya Tulis : Asuhan Keperawatan Pada Ny. N Pasca Partum Spontan Dengan Rupture Perineum Grade II Di Ruang Seruni Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat  
Halaman : xiv + 89 halaman + 1 tabel + 1 lampiran  
Pembimbing : Lina Herida Pinem

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Masa nifas merupakan lanjutan dari persalinan yang memiliki risiko komplikasi pada pembengkakan payudara, peradangan payudara, peradangan endometrium, *post partum blues*, dan infeksi *puerperalis*. Berdasarkan data *World Health Organization* (2015) Komplikasi tersebut dapat memicu peningkatan Angka Kematian Ibu yang saat ini berada pada angka 303.000 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga pelayanan *pasca* persalinan yang berkualitas harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan Ibu dan bayi.

**Tujuan Umum:** Tujuan makalah ilmiah ini yaitu memberikan gambaran secara nyata dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien *pasca partum* spontan dengan *rupture perineum grade II* melalui pendekatan proses keperawatan secara komprehensif.

**Metode Penulisan:** Dalam penyusunan makalah ilmiah ini menggunakan metode penulisan deskriptif narasi dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengungkapkan fakta sesuai dengan data-data yang didapat.

**Hasil:** Hasil dari pengkajian didapatkan tiga diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agens cedera fisik, risiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan, dan defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang Informasi tentang keluarga berencana : kontrasepsi. Diagnosa keperawatan prioritas yang penulis angkat adalah nyeri akut berhubungan dengan agens cedera fisik. Intervensi pada diagnosa keperawatan prioritas yaitu observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam, observasi reaksi non verbal mengenai ketidaknyamanan, lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri dan faktor pencetus, ajarkan penggunaan teknik non farmakologi seperti relaksasi nafas dalam, dan berikan terapi obat Asam Mefenamat 3x500 mg melalui oral sesuai dengan instruksi dokter.

**Kesimpulan dan Saran:** Asuhan keperawatan pada pasien *pasca partum* spontan dengan *rupture perineum grade II* perlu memperhatikan masalah keperawatan nyeri akut. Saran yang dapat diberikan hendaknya perawat dapat meningkatkan kerjasama antar tim maupun pasien yang sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan.

**Keyword:** Asuhan keperawatan, Masa nifas, dan *Pasca partum*

**Daftar Pustaka:** 33 (2011-2019)

**Name of Student** : Nisma Ajeng Virianti  
**Student Number** : 201701032  
**Study Program** : Diploma of Nursing  
**Title of Writing** : Nursing Care In Ny. N Spontaneous Pasca Partum With Perineal Rupture Grade II In The Seruni Room Of Mitra Keluarga Hospital, West Bekasi  
**Page** : xiv + 89 pages + 1 table + 1 attachment  
**Supervisor** : Lina Herida Pinem

## ABSTRACT

**Background:** The puerperium is a continuation of labor that has a risk of complications breast swelling, breast inflammation, endometrial inflammation, postpartum blues, and puerperal infection. Based on data from the World Health Organization (2015) these complications can trigger an increase in maternal mortality which is currently in the numbers 303.000 per 100.000 live birth, so quality postpartum services must be provided at that time to meet the needs of mothers and babies.

**General Purpose:** The purpose of this scientific paper is to provide a real picture of nursing care in patient spontaneous pasca partum with perineal rupture grade II through a comprehensive approach to the nursing process.

**Writing Method:** In the preparation of this scientific paper using a narrative descriptive writing method with a literature study approach that reveals facts by the data obtained.

**Results:** The results of the study found three diagnosis of nursing namely acute pain associated with a physical injury agent, risk of infection associated with tissue trauma, and deficiency of knowledge associated with less information about contraception. The priority nursing diagnosis of the adopted author is acute pain associated with a physical injury agent. Intervention in the priority nursing diagnosis is the observation of vital signs every 4 hours, observation of non-verbal reactions about discomforts, do a comprehensive pain assessment that includes location, characteristics, onset or duration, quality, intensity or severity of pain and precipitating factors, teaching non-pharmacological techniques such as deep breathing relaxation, and given metafenamic acid drug therapy 3x500 mg by oral according to doctor's instructions.

**Conclusions and Suggestions:** Nursing care in patient spontaneous pasca partum with perineal rupture grade II need to pay attention to the problem of acute pain nursing. The advice that can be given should be that nurses can be increases collaboration between teams and patient which is very necessary for the success of nursing care.

**Keyword:** Nursing care, puerperium, and pasca partum

**References:** 33 (2011-2019)