

Nama : Yuni Hemalia
NIM : 201701060
Program studi : DIII Keperawatan
Judul Karya Tulis Ilmiah : Asuhan Keperawatan Pada Ny. M Pasca Partum
Dengan Tindakan *Sectio Caesarea* Atas Indikasi
Letak Bayi Melintang dan Bekas Sectio Caesarea Di
Ruangan Euphorbia
Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur
Halaman : 107 Halaman + 1 Tabel + 6 Lampiran
Pembimbing : Lina Herida Pinem

ABSTRAK

Latar belakang: *Sectio caesarea* seringkali dilakukan atas indikasi faktor penyulit pada saat proses persalinan, baik yang berasal dari kekuatan his ibu (*power*), berasal dari bayi (*passanger*), maupun berasal dari penyulit jalan lahir (*passage*) Komplikasi yang dapat disebabkan oleh *sectio caesarea* adalah terjadi pada ibu yaitu perdarahan, trauma kandung kemih, endometritis, resiko rupture uteri, hingga mencapai kematian. Menurut *World Health Organization*, Angka Kematian Ibu di dunia tahun 2013 adalah 210 kematian per 1000.000, sedangkan Angka Kematian Ibu di negara berkembang 14kali lebih tinggi dibandingkan negara maju, yaitu mencapai 230 per 100.000 kelahiran, sehingga pelayanan pasca partum yang berkualitas harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi.

Tujuan Umum: Tujuan makalah ilmiah ini yaitu memberikan gambaran secara nyata dalam memberikan asuhan keperawatan, pada pasien pasca partum *sectio caesarea* melalui pendekatan proses keperawatan secara komprehensif.

Metode: Dalam penyusunan makalah ilmiah ini menggunakan metode penulisan deskriptif narasi dengan pendekatan studi kasus yang mengungkapkan fakta yang sesuai dengan data yang didapat.

Hasil: Berdasarkan hasil dari pengkajiandidapatkan empat diagnosa keperawatan yaitu risiko perdarahan berhubungan dengan trauma, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur infasif, dan defisit pengetahuan berhubungan dengan informasi KB. Intervensi diagnosa prioritas adalah resiko perdarahan berhubungan dengan trauma tindakan keperawatan yang dilakukan observasi tanda tanda vital, menghitung jumlah perdarahan, observasi kontraksi uterus, konsistensi, jenis lochea, berikan terapi obat Metvelli 3 x 0,125mg melalui oral sesuai dengan instruksi. evaluasi hari ketiga dimana pasien mengatakan perut terasa mulas saat rahim berkontraksi, tekanan darah: 120/80 mmHg, nadi: 88x/menit, dan CRT $\leq$ 3 detik. TFU tiga jari di bawah pusat, kontraksi uterus kuat, dan konsistensi uterus teraba keras. lochea sanguinolenta, berwarna merah kecoklatan sebanyak $\frac{1}{2}$ pembalut nifas, dan tidak berbau.

Kesimpulan dan Saran: Asuhan keperawatan pada Ny.M pasca partum *sectio caesarea* yang perlu diperhatikan adalah jumlah perdarahan selama 3x24jam. Saran yang dapat diberikan adalah perawat tatap meningkatkan kerjasama antar tim maupun pasien untuk keberhasilan asuhan keperawatan.

Kata Kunci : *Sectio caesarea*, Letak Bayi melintang

Daftar Pustaka: (2010 – 2020)

Name : Yuni Hemalia
Student Number : 201701060
Study Program : DIII Keperawatan
Tittle Of Writting : Nursing Care In Ny.M Post Partum With Sectio
Caesarea Action On Indications of The Location of
Transverse Babies and Former Sectio Caesarea In
Euphorbia Room
Page :107 page + 1 Table + 6 attachements
Supervisor : Lina Herida Pinem

ABSTRACT

Background:

Sectio caesarean is often performed on indications of found complications during childbirth, either derived from the strength of his mother (power), derived from the baby (passanger), or derived from the passage (Subekti, 2018). Complications that can be caused by sectio caesarean is to occur in the mother, namely bleeding, bladder trauma, endometritis, risk of uterine rupture, until it reaches death. According to the World Health Organization, maternal mortality in the world in 2013 was 210 deaths per 1000,000, while maternal mortality in developing countries was 14 times higher than in developed countries, reaching 230 per 100,000 births, so quality postpartum services had to be held at that time to meet the needs of mothers and infants.

General Purpose:

The purpose of this scientific paper is to provide a real picture in providing nursing care, in post-partum sectio caesarean patients through a comprehensive approach to the nursing process.

Case Method:

The method of preparing this case report uses a descriptive method, namely by disclosing the facts in accordance with the facts obtained.

Results:

The results of the study obtained four nursing diagnoses, namely the risk of bleeding related to trauma, acute pain associated with physical injury agents, the risk of infection associated with invasive procedures, and knowledge deficits related to birth control information. Priority diagnostic intervention is the risk of bleeding related to trauma nursing measures performed observation of vital signs, counting the amount of bleeding, observation of uterine contractions, lochia type, give metformin drug therapy 3 x 0.125mg through oral in accordance with the instructions. evaluation of the third day in which the patient said the stomach feels heartburn when the uterus contracts, blood pressure: 120/80 mmHg, pulse: 88x/min, and CRT $\leq$ 3 seconds. Three-finger TFU under the center, strong uterine contractions, and hard palpable uterine consistency. lochia sanguinolenta, brownish red as much as 1/2 sanitary pads nifas, and odorless

Conclusion and Suggestion:

Nursing care in Mrs.M post partum sectio caesarean section to note is the amount of bleeding during 3x24 hours. The advice that can be given is that nurses face to face improving cooperation between teams and patients for the success of nursing care.

Keyword: *Sectio caesarean, Transverse Baby Location*

References: (2010- 2020)